

# Diptera Americae septentrionalis indigena.

Descriptio

H. Loe w.

## Centuria quinta.

1. <i>Chasmatonotus unimaculatus.</i>	28. <i>Pachyrrhina unimaculata.</i>
2. <i>Bibio hirtus.</i>	29. - <i>sodalis.</i>
3. - <i>inaequalis.</i>	30. - <i>occipitalis.</i>
4. - <i>nervosus.</i>	31. - <i>xanthostigma.</i>
5. - <i>obscurus.</i>	32. - <i>gracilicornis.</i>
6. - <i>lugens.</i>	33. <i>Spilomyia hamifera.</i>
7. - <i>variabilis.</i>	34. - <i>fusca.</i>
8. - <i>fraternus.</i>	35. <i>Temnostoma obscura.</i>
9. - <i>abbreviatus.</i>	36. - <i>aequalis.</i>
10. - <i>nigripilus.</i>	37. - <i>alternans.</i>
11. - <i>basalis.</i>	38. <i>Lepidomyia calopus.</i>
12. - <i>longipes.</i>	39. <i>Xylota bicolor.</i>
13. <i>Scatopse pygmaea.</i>	40. - <i>barbata.</i>
14. <i>Tipula fraterna.</i>	41. - <i>fraudulosa.</i>
15. - <i>ternaria.</i>	42. <i>Chrysotoxum laterale.</i>
16. - <i>pubera.</i>	43. - <i>pubescens.</i>
17. - <i>macrolabis.</i>	44. - <i>ventricosum.</i>
18. - <i>serrulata.</i>	45. <i>Microdon tristis.</i>
19. - <i>canadensis.</i>	46. - <i>laetus.</i>
20. - <i>latipennis.</i>	47. - <i>coarctatus.</i>
21. - <i>centralis.</i>	48. <i>Ceria abbrevinta.</i>
22. - <i>angulata.</i>	49. <i>Empis laevigata.</i>
23. - <i>tephrocephala.</i>	50. - <i>stenoptera.</i>
24. <i>Pachyrrhina nobilis.</i>	51. - <i>longipes.</i>
25. - <i>virescens.</i>	52. - <i>rufescens.</i>
26. - <i>lugens.</i>	53. <i>Rhamphomyia umbrosa.</i>
27. - <i>vittula.</i>	54. - <i>basalis.</i>

- |     |                                |      |                                    |
|-----|--------------------------------|------|------------------------------------|
| 55. | <i>Rhamphomyia macilenta</i> . | 78.  | <i>Platypalpus lateralis</i> .     |
| 56. | - <i>rustica</i> .             | 79.  | - <i>apicalis</i> .                |
| 57. | - <i>luteiventris</i> .        | 80.  | - <i>flavirostris</i> .            |
| 58. | - <i>nigricans</i> .           | 81.  | - <i>laetus</i> .                  |
| 59. | - <i>hirtipes</i> .            | 82.  | <i>Dolichopus splendidulus</i> .   |
| 60. | - <i>irregularis</i> .         | 83.  | - <i>quadrilamellatus</i> .        |
| 61. | - <i>candicans</i> .           | 84.  | - <i>palaestricus</i> .            |
| 62. | <i>Hilara tristis</i> .        | 85.  | - <i>dorycerus</i> .               |
| 63. | - <i>seriata</i> .             | 86.  | - <i>melanocerus</i> .             |
| 64. | - <i>testacea</i> .            | 87.  | <i>Gymnopternus coxalis</i> .      |
| 65. | <i>Hormopeza brevicornis</i> . | 88.  | - <i>meniscus</i> .                |
| 66. | - <i>nigricans</i> .           | 89.  | <i>Pelastoneurus abbreviatus</i> . |
| 67. | <i>Gloma rufa</i> .            | 90.  | - <i>lamellatus</i> .              |
| 68. | - <i>obscura</i> .             | 91.  | - <i>alternans</i> .               |
| 69. | <i>Cyrtoma femorata</i> .      | 92.  | <i>Porphyrops longipes</i> .       |
| 70. | - <i>procera</i> .             | 93.  | <i>Cordylura praeusta</i> .        |
| 71. | <i>Tachypeza rapax</i> .       | 94.  | - <i>nana</i> .                    |
| 72. | - <i>rostrata</i> .            | 95.  | <i>Tetanocera ambigua</i> .        |
| 73. | - <i>clavipes</i> .            | 96.  | <i>Supromyza decora</i> .          |
| 74. | - <i>pusilla</i> .             | 97.  | <i>Heteroneura melanostoma</i> .   |
| 75. | <i>Platypalpus aequalis</i> .  | 98.  | <i>Opomyza lurida</i> .            |
| 76. | - <i>trivialis</i> .           | 99.  | <i>Ephydria subopaca</i> .         |
| 77. | - <i>pachycnemus</i> .         | 100. | <i>Caenia spinosa</i> .            |

1. *Chasmalonotus unimaculatus*, nov. sp. ♂ et ♀. Ater, alis concoloribus, maculâ marginis postici candidâ. — Long. corp.  $\frac{11}{2}$  lin., Long. al. 1 lin.

Caput atrum, oculis in utroque sexu per frontem latam nitidam separatis. Proboscis brevis nigra; palpi concolores, quadriarticulati; articulus primus brevis; articuli sequentes duo mediocres, aequales, secundus clavatus, tertio crassior; artieulus quartus linearis, praecedenti paulo longior. Antennae nigro-fuscae, breves, in utroque sexu aequales; artieulus basalis globosus; artieuli flagelli quinque breviter pilosi, primus cylindricus, sequentes tres rotundato-ovati, quintus ovatus. Thorax ater, dorso nitido, pleuris opacis. Scutellum concolor. Abdomen nigrum, subopacum, primis segmentis in foeminâ luridis; hypopygium maris globosum, concolor. Pedes nigri, femorum basi sordide lutescente tarsisque in speciminiis immaturis cinereis. Halteres nigri. Alae atrae, maculâ candidâ sub-

triangulari, a margine postico usque ad venam tertiam pertinente ornatae. — (New Hampshire; Osten-Sacken).

Nota. Chasmatonotus, artâ propinquitate cum Hydrobaeno conjunctus, differt tamen palpis longioribus et antennarum flagello in utroque sexu ex articulis quinque composito; thoracis dorsum rimâ tenui, postice in foveolam dilatatâ fissum est, unde nomen.

2. *Bibio hirtus*, nov. sp. ♂ et ♀. *Totus niger, pilis longis sordide albicantibus villosus, alis subalbidis, venis validissimis fuscis, costae propinquas, costâ ipsâ et stigmate nigris.*

♂. capite pedibusque fere totis semper, thoracis dorso et scutello interdum nigro-villosis.

♀. fronde, palpis pedibusque fere totis nigro-pilosus, tibiarum posticarum calcaribus lamelliformibus.

Long. corp. 4— $4\frac{1}{3}$  lin., Long. al.  $3\frac{1}{2}$ — $3\frac{1}{2}$  lin.

Mas: Niger, nitens, pilis longis, sordide albicantibus villosus. Caput pilis longis nigris vestitum. Thoracis dorsum et scutellum plerumque pilis pallidis, interdum nigricantibus vel nigris villosa. Ultima abdominis segmenta nonnumquam praeter pilos pallidos aliquot nigris instructa. Pedes nigri, in speciminibus quibusdam fere toti nigro-pilos. in plerisque femora anteriora supra et postica in basi pallide villosa. Calcaria tibiarum anticarum valde inaequalia, posticarum brevia et valida. Alae albicantes, venis validissimis nigro-fuscis, costae propinquas, costâ ipsâ et stigmate nigris.

Foem.: Mari simillima, sed brevius pilosa, pilis palporum et frontis nigris, thoracis, scutelli abdominalisque pallidis; pedum pili ut in mare colorati sunt, sed multo breviores. Calcaria tibiarum posticarum compressa, lamelliformia, obtusa. — (California; Agassiz).

Nota. Bibioni albipenni Say affinis, sed pilis totius corporis confertioribus et multo longioribus alisque foeminae non cinereis facile distinguitur. —

3. *Bibio inaequalis* nov. sp. ♀. *Ex badio testaceus, capite nigro, pedibus testaceis, calcari interiore tibiarum anticarum brevissimo, alis aequaliter ex luteo subfuscis.* — Long. corp.  $3\frac{5}{6}$  lin., Long. al. 4 lin.

Ex badio testaceus, pilis brevibus pallidis vestitus. Caput nigrum, antennis palpisque concoloribus. Metanotum nigro-fuscum. Venter ochraceus, postico segmentorum singulorum margine fusco. Pedes testacei. tarsis anterioribus inde ab articuli primi, posticis

inde ab secundi apice fusco-nigris, calcari interiore tibiarum antecarum omnium brevissimo. Alae totae aequaliter ex luteo subfuscæ. venis posticis concoloribus, anticis cum costâ et stigmate subfuscis. — (Sitka; Kolenati).

4. *Bibio nervosus* nov. sp. ♀. *Niger, coxis pedibusque rufis, trochanteribus, genibus, tibiis primisque duobus tarsorum articulis in apice, reliquis tarsorum articulis totis nigris, calcaribus tarsorum antecorū valde inaequalibus; alae ex subfusco cinereac, venis validis fuscis, costae propinquis, costâ ipsâ et stigmate nigro-fuscis.* — Long. corp.  $3\frac{1}{3}$  lin., Long. al. 4 lin.

*Niger*, ventre et capite concoloribus, pilis brevibus pallidis vestitus. Pedes cum coxis rufi; genna nigra; tibiae anticae praeter annulum medium nigrae, calcaribus valde inaequalibus; tibiae posteriores et primi duo tarsorum articuli in apice, artieuli tarsorum reliqui toti nigri, imâ tertii basi tamen exceptâ; calcaria tibiarum posticarum medioeria. Alae totae aequaliter ex fusco cinereac, venis fuscis. stigmate, costâ et venis costae propinquis nigro-fuscis. — (California; Agassiz).

Nota. Proxime affinis est *Bibioni xanthopo* Wied., sed alis alarumque venis tibiarumque antecorū calcari interiore longiore diversus. —

5. *Bibio obscurus* nov. sp. ♀. *Niger, nitidus, ventre coxisque concoloribus, pedibus rufis, tibiarum antecarum calcaribus valde inaequalibus, alis dilutissime subfuscis, costâ cum venis costae propinquis et cum stigmate angusto subfuscis.* — Long. corp.  $4\frac{1}{4}$  lin., Long. al.  $3\frac{7}{12}$  lin.

*Niger*, nitidus, ventre coxisque concoloribus, pilis pallidis vestitus. Pedes rufi vel rufo-testacei, genibus nigris, tarsis apicem versus fusco-nigris; calcaria tibiarum antecarum valde inaequalia, posticarum parva. Alae inaequaliter, sed dilutissime subfuscæ, venis posticis paulo obscurioribus, anticis cum costâ et stigmate angusto subfuscis. — (Hudsons Bay Territory; Kennicot).

Nota. A *Bibione xanthopo* Wied. coxis nigris, tibiis anticis minus latis, venis posticis alarum dilutioribus et stigmate angustiore differt.

6. *Bibio lugens* nov. sp. ♀. *Niger, nitens, ventre concolor. coxis pedibusque rufis, tibiarum antecarum calcaribus valde inaequalibus, alis nigro-fuscis adversus costam obscurioribus, imâ*

*basi sordide albicante, stigmate nigro.* — Long. corp.  $3\frac{1}{2}$  lin.,  
Long. al.  $3\frac{1}{3}$  lin.

Niger, modice nitens, ventre concolore, pilis pallidis vestitus. Pedes cum coxis rufi, apice tibiarum anticarum late, reliquarum anguste nigro, tarsis nigris, articulo primo praeter basim et articuli secundi basi rufis; calcaria tibiarum anticarum valde inaequalia, posticarum medioeria. Alae nigro-fuscae, adversus costam obscuriores, in innâ basi sordide albicantes; venae validae, posticae fuscae, anticae cum costâ et cum stigmate fusco-nigrae vel nigrae; ultimum venae quartae segmentum rectum. — (Winnipeg; Keunicot).

Nota. Bibioni basali valde propinquus, sed calcaribus tibiarum anticarum admodum inaequalibus, posticarum brevioribus, basi alarum obsoletius albicante et ultimo venae quartae segmento recto diversus. —

7. *Bibio variabilis* nov. sp. ♂ et ♀. *Niger, nitens, calcaribus tibiarum anticarum subaequalibus, posticarum majusculis.*

♂. raro totus nigro-pilosus. plerumque abdomine vel toto vel praeter basim pallide piloso; tibiae piceo-rufae, apicem versus nigrae; primi tarsorum articuli in apice, reliqui toti nigri; alae pure hyalinæ, venis posticis pallidis, anticis cum costâ et stigmate nigro-fuscis.

♀ pilis brevibus pallidis vestita; coxae rufae, posticae plerumque ex parte obscuriores; pedes rufi, genibus, tibiarum apice tarsisque nigris, primis tribus tamen tarsorum articulis praeter apicem rufis; alae subfuscæ, adversus costam obscuriores, venis posticis subfuscis, anticis cum costâ et stigmate nigro-fuscis.

Long. corp.  $3-3\frac{3}{4}$  lin., Long.  $3\frac{1}{6}-3\frac{3}{4}$  lin.

Mas: Niger, nitidus, coxis femoribusque concoloribus, tibiis anticis plerumque piceis, ante apicem nigricantibus, posterioribus piceo-rufis, apicem versus fusco-nigris, tarsorum articulis primis tribus in apice, sequentibus totis nigris. Raro totus nigro-pilosus, plerumque abdomen vel totum vel praeter segmenta prima pallide pilosum, interdum pleurae et coxae etiam pallide pilosae. Alae pure hyalinæ, venis posticis pallidis, anticis cum costâ et stigmate nigro-fuscis.

Fœm: Nigra, modice nitens, pilis brevibus pallidis vestita. Coxæ rufae, posticae plerumque ex parte obscuriores; pedes rufi, genibus et extremo tibiarum posteriorum apice ex fusco nigris, tibiis anticis in basi et ante apicem fuscis vel fusco-nigris, tarsorum articulis primis tribus in apice, reliquis totis fusco-nigris. Alae sub-

fuscae, adversus basim et angulum axillarem dilutiores, adversus costam obscuriores, venis posticis subfuscis, anticis cum costâ et stigmate nigro-fuscis. — (Sitka; Kolenati, Sahlberg. — New Hampshire; Osten-Sacken).

8. *Bibio fraternus* nov. sp. ♂ et ♀. *Niger*, *pedibus rufis*, *tibiarum anticarum calcaribus subaequalibus*, *longitudine tarsorum posticorum ordinaria*.

♂. *corpo, praeter oculos et palpos, albido-piloso, coxis nigris, alis dilutissime cinereo-hyalinis.*

♀. *pilis brevibus pallidis vestita, thoracis dorso coxisque rufis, alis subfuscis.*

Long. corp.  $1\frac{1}{2}$  lin., Long. al.  $1\frac{1}{2} - 1\frac{7}{12}$  lin.

Mas: *Niger*, nitens, pilis longiusculis pallidis vestitus, pilis tamen oculorum, genarum palporumque nigris. Coxae concolores. Pedes ex testaceo rufi, genibus, tibiis anticis in apice et basi posterioribusque in extremo apice nigris. primis duobus tarsorum articulis in apice, reliquis totis nigris; calcaria tibiarum anticarum subaequalia, posticarum mediocria; tarsi postici non breviores quam in speciebus plerisque. Alae dilutissime cinereo-hyalinae, venis dilute subfuscis, stigmate saturate fusco. — (District Columbia; Osten-Sacken).

Fem.: *Nigra*, thoracis dorso rufo, pilis brevibus pallidis vestita. Coxae rufae, posticae anterioribus obscuriores. Pedes ex testaceo rufi, notis iisdem nigris, quas pedes maris habent, tibiis tamen anticis interdum praeter annulum medium obscure rufum totis nigris. Alae ex cinereo subfuscæ, adversus costam saturatis subfuscæ, venis posticis subfuscis, anticis cum costâ et stigmate nigro-fuscis. — (District Columbia; Osten-Sacken).

Nota. Focmina interdum thoracis dorsum nigro bimaculatum habet.

9. *Bibio abbreviatus* nov. sp. ♂ et ♀. *Niger*, *pedibus rufis*, *tibiarum anticarum calcaribus subaequalibus*, *tarsis posticis brevioribus quam in speciebus affinibus*.

♂. *corpo praeter caput totum albido-piloso, coxis nigris, alis pure hyalinis, venis posticis sine colore, anticis et costâ fuscis, stigmate nigro-fusco*.

♀. *pilis brevibus pallidis vestita, thoracis dorso coxisque rufis, alis subfuscis.*

Long. corp.  $1\frac{1}{2}$  lin., Long. al.  $1\frac{1}{2} - 1\frac{7}{12}$  lin.

Bibioni fraterno simillimus, sed tarsis posticis brevioribus certo distinctus. Mas caput totum nigro-pilosum, alas pure hyalinæ et tibias posticas breviores et paulo latiores quam Bibio fraternus habet, cum quo in reliquis notis omnibus plane congruit. Foemina præter tarsos posticos breviores a Bibionis fraterni foeminâ non differt. — (District Columbia; Osten-Sacken).

10. *Bibio nigripilus* nov. sp. ♂. *Niger, nigro-pilosus, coxis concoloribus, pedibus rufis, tibiæ antarum calcaribus subaequalibus, longitudine tarsorum posticorum ordinariâ; alæ pure hyalinæ. venis posticis sine colore, anticis et costâ fuscis, stigmate nigro-fusco.* — Long. corp.  $1\frac{1}{2}$  lin., Long. al.  $1\frac{1}{2}$  lin.

Inter Bib. fraternum et abbreviatum quasi intermedius, tarsos posticos longiores illius cum alis hyalinis hujus conjungens, cum utroque corporis pedumque picturâ congruit, sed pilis totius corporis nigris ab utroque differt. — (Winnipeg; Kennicot).

Nota. Dilophus articulatus Say in viciniam Diloph. fraterni, abbreviati et nigropili referendus videtur; sed et Sayi et Wiedemannii descriptio nimis incerta et ambigua est, ut judicari possit, ad quem eorum pertineat.

11. *Bibio basalis* nov. sp. ♀. *Niger, coxis pedibusque rufis, calcaribus tibiæ antarum subaequalibus, alis nigro-fuscis adversus costam obscurioribus, basi albidâ, stigmate et venis nigro-fuscis* — Long. corp. 3 lin., Long.  $3\frac{3}{4}$  lin.

Niger, nitidus, capite et thoracis dorso subopacis, pilis brevibus pallidis, adversus apicem abdominis nigris vestitus. Pedes cum coxis rufi, nigro-pilosuli, genibus et tibiæ apice nigris, tibiæ antarum calcaribus subaequalibus, tarsis nigris, articulis primis duobus præter apicem rufis. Alæ nigro-fuscae, adversus costam obscuriores, basi albidâ, venis omnibus et stigmate nigro-fuscis. — (New Hampshire; Osten-Sacken).

12. *Bibio longipes* nov. sp. ♂ et ♀. *Macer, niger, nitidus, calcaribus tibiæ antarum valde inaequalibus.*

♂. *coxae et pedes concolores; caput pilis nigris, reliquum corpus pallidis vestitum; pedes postici elongati, tibiæ clavatis tarsorumque articulis valde incrassatis; alæ hyalinæ, venis posticis dilatissime cinereis, anticis cum costâ et stigmate nigro-fuscis.*

♀. *pilis breribus pallidis restita; thorax testaceo-rufus, plerumque nigro-maculatus; pedes cum coxis testaceo-rufi. genibus, tibi-*

*arum apice tarsisque (articuli primi basi tamen excepta) nigris; alae dilute subcinerascentes, venis posticis dilute subfuscis, anticis cum costâ et stigmate ex fusco nigris.*

Long. corp.  $2\frac{1}{6}$  —  $2\frac{7}{12}$  lin., Long. al.  $2\frac{1}{4}$  —  $2\frac{7}{12}$  lin.

Mas: Bibionis gracilis mari simillimus, tarsorum posticorum articulos singulos crassiores et alas non cinereas, sed pure hyalinæ, venis posticis dilutioribus instructas habet; praeterea pili thoracis et scutelli, quos Bibio gracilis nigros habere solet, in hoc nostro Bibione longipede semper pallidi sunt. — Foemina a Bibionis gracilis foeminâ pedibus posticis brevioribus, alis non ex cinereo subfuscis, sed dilutissime subcinerascentibus venisque posticis dilutioribus differt. — (District Columbia; Osten-Sacken).

13. *Scatopse pygmaea* nov. sp. ♀. *Nigra, modice nitens, alis hyalinis, venâ longitudinali secundâ brevi, furcâ tertiae mediocri, basim versus angustissimâ, apicem versus subito dilatatâ.* — Long. corp.  $\frac{5}{12}$  lin., Long. al.  $\frac{1}{2}$  lin.

*Nigra, modice nitens, tarsis sordide albicantibus vel subfuscis. Antennae breves, crassiusculæ. Alae albido hyalinae, venis primis duabus et costâ inde a basi usque ad venæ secundæ finem subcinerascentibus, reliquis sine colore; vena secunda, primam longitudine paulo superans, dimidiâ alâ brevior est; venæ tertiae furca mediocris, sed pedunculo multo brevior, ramis prope basim valde approximatis, apicem versus subito divergentibus, anteriore recurvo, posteriore incurvo.* — (District Columbia; Osten-Sacken).

14. *Tipula fraterna* nov. sp. ♀. *Antennæ ochraceæ, apicem versus subfuscæ, flagelli articulis in basi atris; alae vittatae, limbis venæ quintæ angustius obscuriusque, costæ latius et paulo dilutius fuscis, vittâ mediâ cinerascente usque ad cellularum basaliū finem pertinente et fasciâ irregulari albidâ a costâ per cellulæ discoidalis basim prope ad marginem posticum ductâ.* — Long. corp.  $6\frac{1}{2}$  lin., Long. al.  $8\frac{5}{12}$  lin.

Caput ex fusco cinereum, lineâ mediâ frontis et occipitis fuscâ. Rostrum ochraceum, lateribus infuscatis; palpi subfuscii. Antennæ laete ochraceæ, apieem versus ex ochraceo subfuscæ, flagelli articulis inde ab secundo in basi atris. Thoracis dorsum cinerascens, vittis fusco-cinereis, subohsolete fusco marginatis, mediâ per lineam nigro-fuseam dissectâ. Abdominis latera praeter basim late infuscata. Extremus femorum apex fuscus. Alae vittatae, limbis costæ et venæ quintæ fuscis, illo latiore, sed extra cellulam subcostalem

dilutiore, vittâ mediâ subcinerascente usque ad venulam transversam medium ductâ; fascia irregularis albida, ante stigma costam attingens, per cellulam discoidalem, per cellulæ posterioris quartæ basim et per cellulam posteriorem quintam fere ad posticum usqne alae marginem extenditur. — (District Columbia; Osten-Sacken).

15. *Tipula ternaria* nov. sp. ♂. *Cinereo-nigra, posticis segmentorum abdominalium singulorum marginibus appendicibusque hypopygii luteis, antennis pulpisque nigris; alae maculatae, maculâ obscurâ insigni in cellularum basarium initio.* — Long. corp.  $6\frac{1}{2}$  lin., Long. al. 7 lin.

*Cinereo-nigra, opaca. Caput concolor, rostro cum palpis nigro. Antennæ breves, nigrae, secundo flagelli articulo badio. Dorsales thoracis vittæ nigrae. media e vittis duabus et lineâ composita. Scutellum nigrum, lateribus albido-pollinosus; metanotum cinereo-nigrum. Pleurae cinereæ. Abdomen cinereo-nigrum, margine segmentorum singulorum postico ex luteo ochraceo. Hypopygium magnum, nigro-fuscum, lamellâ supremâ nigrâ, latiore quam longiore. appendicibus luteis. Pedes nigri, femoribus praeter apicem luteis, tibiarum basi ex fusco luteâ. Alae ex fusco cinereæ, maculis nigricantibus tribus, primâ cellularum basarium initium tegente, maculisque albidis compluribus variegatae; cellulæ posteriores praeter albidam primæ et quartæ basim immaculatae et maculae albidae in postico alarum margine nullæ.* — (Hudsons Bay Territory; Keweenaw).

16. *Tipula pubera* nov. sp. ♂. *Testacea, vittis thoracis paulo obscurioribus, corpore toto pilis solitis longioribus vestito; flagellum antennarum fusco-nigrum; alae maculatae, cellulæ posterioribus omnibus albido-marginatis, venae longitudinalis secundae ramulo anteriore abbreviato.* — Long. corp. 9 lin., Long. al. 10 lin.

Ex luteo testacea vel ochracea, opaca, pilis longioribus, in vertice, rostro et palpis nigricantibus, in reliquo corpore pallidis vestita. Caput totum concolor, ultimo palporum articulo antennarumque flagello fuscis, primo tamen hujus articulo dilutiore. Vittæ thoracis reliqui corporis colore, paulo tamen saturatiore tinctæ. Scutellum et metanotum immaculata. Abdomen lineæ mediae subfuscæ vestigium et utrinque lineam subfuscæ habet. Hypopygium permagnum, concolor, lamellâ insimâ magnâ. in margine apicali pilis confertissimis subancreis babatâ. Pedes ex luteo subfusci, femorum tibiarumque apice et ultimis tarsorum articulis nigro-fuscis. Alae

ex cinereo fuscae, maculatae, venae secundae ramulo anteriore abbreviato; macula obscura major in cellularum basarium initio nulla; stigma fuscum; basis venae secundae, venae transversales, vena longitudinalis quinta tota venarumque reliquarum apices fuso-limbatae; cellulae posteriores albido marginatae; cellulae axillaris primae margo maculâ et strigulâ albidis notatus. — (California; Agassiz).

17. *Tipula macrolabis* nov. sp. ♂ et ♀. *Testacea, thoracis dorso cinereo, fusco-vittato, vittâ mediâ per lineam cinereum dissectâ; alae maculatae, maculâ obscurâ majore in cellularum basarium initio nullâ, prope marginem anticum maculis obscuris tribus, adiectâ quartâ obsoletiore, maculis albicantibus compluribus sparsis, cellula posteriori primâ prope marginem albido-lituratâ.* — Long. corp.  $6\frac{1}{2}$ — $6\frac{5}{6}$  lin., Long. al.  $7\frac{1}{2}$ — $7\frac{1}{2}$  lin.

*Testacea, thorace vel toto cinereo, vel ex flavo cinereo, senitulo, melanoto plenisque flavicantibus. Caput cinereum, lineâ occipitis et frontis fuscâ. Rostrum ex fuso testaceum vel fusco; palpi ex fuso nigri, basi fuscâ. Scapus antennarum luteus, flagellum ex luteo subfuscum vel fusco, basi articulorum singulorum nigrâ. Vittae thoracis saturate fuscae, media per lineam latiusculam cinereum dissecta. Abdomen maris ex luteo testaceum, subfusco trilineatum. Abdomen foecinae multo obscurius coloreum post mortem mutavisse videtur. Hypopygium maris permagnum, reliquo corpore obscurius, subbadum, lamellis lateralibus valde elongatis, linearibus, arenatis et forepis speciem efficientibus. Terebra foecinae mediocris, segmento basali brevi, ex basi latâ subito attenuato, lamellis tenuibus aentis. — Pedes lutei, femorum tibiarnmq; apice et tarsis praeter basim fuscis. Alae maculatae, maculâ obscurâ majore in cellularum basarium initio nullâ; maculae fuso-nigrae subquatuor prope marginem anticum, primae duae quadrangulae in cellulâ basali primâ sitae, tertia irregularis cum stigmate contigna, quarta praecedentibus obsoletior subapicalis; maculae albidae complures; cellularum posteriorum margines clutae, quartae et quintae ex parte albidae; cellula axillaris prima prope marginem lituram vel maculam albidam, interdum obsoletam habet.* — (Hudsons Bay Territory; Kennicot).

18. *Tipula serrulata* nov. sp. ♀. *Thoracis vittae dorsales fusco-marginatae; alae maculatae, maculis fuso-nigris duabus, alterâ minore venae secundae basim tegente, alterâ cum stigmate contiguâ, maculis albidis compluribus diffusis, nullis tamen in mur-*

gine postico; lamelloe terebrae infra serrulatae. — Long. corp.  $10\frac{1}{3}$  lin., Long. al.  $9\frac{1}{2}$  lin.

Testacea, thoracis colore in cinereum vergente. Caput concolor, palporum apice fusco. Scapus antennarum testaceus (flagellum deest). Thoracis vittae dorsales ex testaceo fuscae, anguste fusco-marginatae, media per lineam obsoletiorem fuscam dissecta. Scutellum et melanotum immaculae. Abdomen vittis tribus angustis fuscis pictum. Lamellae terebrae latiusculae, leniter recurvae, infra serrulatae. Femora lutea, apice subfuscō; tibiae et tarsi ex luteo subfuscī, apice illarum et ultimis horum articulis fusco-nigris. Alae fusco-cinereae, maculatae, maculis fuscis duabus, alterā minore in venae secundae basi sitā, alterā irregulari cum stigmate concōlore in unam connatā, maculis albidis compluribus diffusis, in marginē postico tamen nullis; cellularum posteriorum prima in basi albida, quarta et quinta in basi et marginib⁹ adversis elutae, reliquae immaculatae. — (Hudsons Bay Territory; Kennicot).

Nota. Foeminae unicam Tipulae serrulatae, sordidam et multilatam descripsi; a Tipulā tessellatā, cui proxima, corpore minus robusto, alis dilutius et parcius maculatis, maculā obscurā magiore in cellularum basalium initio destitutis et pedibus longioribus gracilioribusque certe differt.

19. *Tipula canadensis* nov. sp. ♂. Thorax ex cervino cinereis, vittis cinereis fusco-marginatis, mediā per vittulam fuscam subfusiformem dissectā; alae subfuscæ maculis subquatuor albidis variegatae, cellularis posterioribus praeter albidum primæ et quartæ basim immaculatis. — Long. corp. 6 lin., Long. al. 7 lin.

Ex luteo testacea. Caput cinereum, rostro luteo, supra subfuscō. Palpi ex fusco nigri. Antennarum scapus luteus. flagellum ex ochraceo subfuscum, articulis praeter primum infra excisis, in basi nigris. Thoracis dorsum ex cervino cinereum, vittis cinereis fusco-marginatis; vitta media per vittulam subfusiformem fuscam dividitur. Pleurae ex fusco cinereae. Scutellum et melanotum ex fusco cinerea. Abdomen ex luteo testaceum, vittis tribus aequalibus fuscis, segmentis ultimis fere totis nigro-fuscis. Hypopygium parvum lamellis superioribus minutissimis, rotundato-ovatis. Pedes fusi. femoribus adversus basim luteis. Alae subfuscæ, adversus costam obsolete sublutescentes, maculis subquatuor albidis variegatae; macula minuta in venae secundae basi et stigma fusca; cellularum posteriorum prima et quarta in basi albicantes, reliquæ immaculatae. — (Hudsons Bay Territory; Kennicot).

**Nota.** *Tipula canadensis*, *Tipulae baliopterae* proxima, antennas obscuriores, vittam thoracis medium vittulâ fusca integrâ dissectam, apicem abdominis juxta hypopygium non excavatum et superiores hypopygii lamellas multo breviores habet.

**20.** *Tipula latipennis* nov. sp. ♂. *Pallida, antennis nigro-annulatis, thoracis dorso ex fusco ochraceo, vittis concoloribus fusco-marginatis; alae latae, ex luteo dilute subfuscæ, maculis aliquot fuscis albidisque pluribus variegatae, maculâ obscurâ majore in cellularum basalium initio nullâ, cellulis posterioribus praeter albidiā primæ basim cellulisque axillaribus immaculatis; lamellæ hypopygii suprema nigra, non longior quam latior.* — Long. corp. 5½ lin., Long. al. 7½ lin.

Pallida vel dilute ochracea. Caput concolor, vertice subcinerascente. Antennæ ochraceæ, apicem versus obscuriores, articulis flagelli simplicibus, basi primi nigricante, reliquorum nigrâ. Rostrum luteum, lateribus obscurioribus. Palpi ochracei vel ex fusco ochracei, basi fusca. Thoracis dorsum fusco-ochraceum; vittæ concolores, fusco-marginatae; margines vittarum lateralium aequales, vittæ mediae postice attenuati, antice valde dilatati. Pleurae ex flavo obsolete cinerascentes, immaculatae. Abdomen fusco univittatum. Hypopygium magnum, appendicibus pendulis nullis instructum, lamellâ supremâ rotundâ, nigrâ. Femorum apex fuscus. Alae latae, ex luteo dilute subfuscæ, adversus costam intescentes, maculis saturationibus paucis, albidis pluribus variegatae; basis venae secundæ fusco-marginata; stigma fuscum; cellularum posteriorum prima in basi albicans, reliquæ immaculatae; maculae albidae in cellulis axillaribus omnino nullæ; venulae transversales basi alarum proximæ infuscatae, sed macula obscura major in cellularum basalium initio nulla. — (New Hampshire; Osten-Sacken).

**Nota.** A *Tipulâ hebete* alis latioribus, antennarum apice obscuriore, pleuris omnino immaculatis et abdome fusco-vittato disert; hypopygium minus, appendicibus pendulis vel inflexis destitutum, lamellâ supremâ non oblongâ et lateâ, sed rotundâ et nigrâ instructum diversitatem maris aperte demonstrat.

**21.** *Tipula centralis* nov. sp. ♂. *Obscure cinerea, vittis thoracis concoloribus obsoleta et subtiliter fusco marginatis, abdome sordide testaceo, vittis tribus et segmentis ultimis duobus nigris; alae ex cinereo fuscae, stigmate et maculâ in venae secundæ basi nigro-fuscis, maculâ minutâ centrali cellulisque discoi-*

*dali et posteriore quartâ in basi albidis; hypopygium parvum, lamellis superioribus brevibus, truncatis. — Long. corp. 7 lin., Long. al. 8 lin.*

Caput obscure cinereum, lineâ tenui occipitis et frontis fuscâ, lateribus rostri nigris. Palpi nigri. Scapus antennarum luteus, basi articuli primi fuscâ; primus flagelli articulos luteus, basim versus nigricans, reliquum flagellum fuscum, apicem versus nigrum, basi articulorum singulorum atrâ. Thoracis dorsum obscure cinereum, vittis concoloribus, subtiliter et obsolete fusco-marginatis, mediâ per lineam dilutius cinereum divisâ. Abdomen sordide testaceum, vittâ mediâ, vittis lateralibus obsoletioribns nltimisque duobus segmentis fusco-nigris, margine lateralî ipso subalbicante. Hypopygium parvum, lamellâ supremâ nigrâ, reniformi, lamellis superioribus parvis truncatis. Pedes fusco-nigri, femoribus adversus basim luteis, tibiarum basi fuscâ. Alae ex cinereo fuscae, stigmate, maculâ obsoletâ contiguâ et maculâ alterâ venae secundae basim tente saturate fuscis, maculâ parvâ albidâ in cellulæ basalis secundae margine postico, basi venae secundae oppositâ, cellulâ disoidali et posteriore quartâ in basi obsolete albicantibus. — (Hudsons Bay Territory; Kennicot).

22. *Tipula angulata* nov. sp. ♂ et ♀ *Lutea, thoracis dorso ex flavo cinereo, vittis cinereis, mediâ postice valde attenuatâ et per lineam ex flavo cinereum divisâ; antennae luteae, articulis flagelli in basi nigris; alae maculatae, fasciâ albidâ subapicali integrâ, angulatâ. Long. corp. 6—6½ lin., Long. al. 8 lin.*

Caput ex luteo cinereum, lineâ occipitis et frontis tenuissimâ fuscâ, rostro luteo. Palpi fusi vel ex luteo fusi, basi luteâ. Antennae ex luteo ochraceae, articulis flagelli praeter primum in basi nigris. Thoracis dorsum ex flavo cinereum, vittis cinereis, mediâ postice valde attenuatâ et per lineam dilute cinereum dissecatâ. Senuillum, metanotum et pleurae flavae. Abdomen luteum, vittâ mediâ fuscâ. Hypopygium medioere, concolor, lamellâ supremâ nigro-fuscâ. Terebra testacea, lamellis tenuibus acentis. Pedes lutei, femorum apice, tibiis apicem versus tarsisque nigro-fuscis. Alae longae, fusco-cinereae, basim versus dilutiores, ante apicem fasciâ albidâ integrâ angulatâ ornatae; macula fusca majuscula cellularum basaliū initium explet. — (Massachusetts).

Nota. Foeminam possideo nuper exclusam,  $5\frac{3}{4}$  lin. longam, quae antennarum articulos in basi levissime tantum nigricantes, venae secundae ramulum anteriorem valde abbreviatum et maculam

fuscam in cellularum basalium initio sitam valde minutam habet. Utrum varietas *Tipulae* angulatae, an species diversa sit, dubito. — (New Hampshire; Osten-Sacken).

23. *Tipula tephrocephala* nov. sp. ♂. *Lutea, capite supra albido-cinereo, antennarum flagello nigro, basi articulorum singulorum pallidâ; alae cinereo-hyalinae, cellulâ costali luteâ, stigmate fusco, maculâ cum stigmatis busi cohaerente albidiâ.* — Long. corp.  $6\frac{1}{3}$  lin., Long. al.  $7\frac{1}{2}$  lin.

*Lutea.* Caput supra albido-cinereum. Palpi subfuscui. Antennarum scapus luteus, flagellum ex fusco luteum, articulo primo praeter apicem, reliquis in basi luteis. Vittae dorsales thoracis ochraceae. laterales angustae, media e vittis duabus angustis, inter-  
vallo lato separatis composita. Abdominis segmenta siugula prope marginem posticum lineam transversam fuscam habent, ultima fere tota fusca sunt. Hypopygium parvum compressum. Pedes lutei, femorum tibiarumque apice et tarsis praeter basim fusco-nigris. Alae ciereo hyalinae, basi et cellulâ costali lutescentibus, stigmate fusco, maculâ albidiâ cum stigmatis busi contignâ, interdum usque ad cellulæ discoidalis basim extensâ. — (New Hampshire; Osten-Sacken).

24. *Pachyrrhina nobilis* nov. sp. ♀. *Flava, vittis thoracis atris nitidis, scutello et melanoto immaculatis, abdomine serie mediâ macularum nigrarum maculisque lateralibus candido-micantibus ornato, terebrâ brevissimâ obtusâ.* — Long. corp.  $4\frac{2}{3}$  lin., Long. al. 6 lin

Capit flavum, opacum, rostro et scapo antennarum concoloribus, flagello antennarum nigro-fusco. Thorax flavus, pleuris, scutello et melanoto concoloribus, immaculatis, vittis dorsalibus atris, nitidis. Abdomen flavum, serie mediâ macularum nigro-fuscarum maculisque lateralibus candido-micantibus: venter flavus, segmentorum anticornu margine postico et segmentis posticis fere totis candido-micantibus. Terebra flava, brevissima, obtusa. Pedes flavi, femorum tibiarumque apice et tarsis totis fusco-nigris. Alae lutescentes, limbo apicis venacumque transversalium limbis nigricantibus, stigmate fusco. — (New Hampshire; Osten-Sacken).

25. *Pachyrrhina virescens* nov. sp. ♂. *Flava, capite concolore immaculato, thorace in mortuâ ex viridi flavo, in vivâ viridi, pleuris et melanoto immaculatis, vittis dorsalibus nigro et*

*badio variis, lateralium parte anteriore exterius incisâ. — Long. corp. 4 $\frac{5}{6}$  lin., Long. al. 4 $\frac{5}{6}$  lin.*

Capit aurantiacum, opacum, immaculatum, rostro paulo dilutiore. Scapus antennarum et primus flagelli articulus flavi, artieuli reliqui nigri, longiusculi, infra excisi. Thorax in vivâ viridis post mortem flavescit; vittae dorsales nigro et badio variae, prope laterales dorsi margines opacae, in reliquo dorso nitidae; vitta media antice subito dilatata; strigula flava inde a margine laterali thoracis in anteriores vittarum lateralium partem ducitur. Pleurae immaculatae. Abdomen flavum, serie mediâ macularum fuscarum. Hypopygium flavum, lamellis supremis lauceolatis. Pedes flavi, femorum tibiarumque apice et tarsis totis ex fusco nigris. Alae cinereo-hyalinae, stigmate subfusco. — (District Columbia; Osten-Sacken).

26. *Pachyrrhina lugens* nov. sp. ♀. *Atro et aurantiaco varia, fronte atro-bipunctata et melanoto atro-vittato; alae infuscatae; terebra acuta. — Long. corp. 5 $\frac{1}{2}$  lin.. Long. al. 4 $\frac{1}{2}$  lin.*

Caput aurantiacum; frons opaca, utrinque puncto atro ornata; triangulum occipitale atrum. subunitens, latum, angulo antico acuminato; facies aurantiaca, infra antennas punctum quadrangulare atrum gerens; rostrum aurantiacum, nitens. supra (margine antico tamen excepto) atrum, in lateribus nigro-fuscum; palpi et antennae nigrae. Collare aurantiacum, lateribus nigris. Thoracis vittae dorsales latissimae, atrae, nitidae. Pleurae atrae, subnitidae, aurantiaco maculatae. Scutellum atrum; metanotum aurantiacum, vittâ mediâ et maculâ posticâ atris. Abdomen aurantiacum; segmentum primum atrum; segmenta sequentia quatuor singula fasciâ posticâ atrâ opacâ ornantur, quae latera versus attenuata est et in medio ab domine ito dilatatur, ut cum fasciâ segmenti praecedentis cohaereat; segmenta sextum et septimum aurantiaca, octavum excepto margine postico atrum, nitidum. Terebra atra, apicem versus pieca, lamellis tenuibus acutis. Coxae atrae; trochanteres et femora lutea, haec apicem versus nigra; tibiae nigro-fuscae, apicem versus nigrae; pedes toti nigri. Alae infuscatae, triente apicali dilutiore, cellulâ costali luteâ, stigmate et venis nigris, limbo apicis venarumque transversalium limbis nigris antibus. — (New Hampshire; Osten-Sacken).

27. *Pachyrrhina vittula* ♂. *Frons postica et occiput subnitida, vittâ mediâ nigrâ; thoracis vittae dorsales nigrae, pleurae nigro-maculatae; abdomen nigro trivittatum, vittis lateralibus tenui-*

*bus interruptis; alae cinereae, stigmate subfuscō.* — Long. corp.  $5\frac{1}{2}$  lin., Long. al.  $6\frac{1}{2}$  lin.

Caput flavum; frons postice et occiput modice nitida. vittā mediā usque ad marginem anticum frontis productā punctisque duobus frontalibus nigris; rostrum concolor, fusco quadriguttatum; palpi flavi; scapus antennarum flavus, flagellum nigrum, articulis singulis infra leviter excisis. Collare utrinque nigro-maculatum; vittae dorsales nigrae, nitidae, media antice modice dilatata. Pleuræ maculis fusco-nigris variegatae. Scutellum luteum. Metanotum lineā mediā fuscā et maculā posticā luteā pictum. Abdomen nigro-trivittatum, vittā mediā integrā, vittis lateralibus tenuibus et interruptis. Hypopygium mediocre, laminā supremā totā et infimae basi nigris, appendicibus flavis, supremis lanceolatis. Pedes lutei, femorum tibiarumque apice et tarsis totis ex fusco nigris. Alae cinereae, stigmate subfuscō. — (Hudsons Bay Territory; Kennicot).

28. *Pachyrrhina unimaculata* nov. sp. ♂. *Lutescens, capite thoraceque opacis, vittis hujus subochraceis et subfuscō-marginatis; antennae luteae, articulis flagelli longiusculis, inde a secundo in basi. ultimis totis nigris; alae sublutescentes, stigmate fusco.* — Long. corp.  $4\frac{1}{4}$  lin., Long. al.  $5\frac{1}{6}$  lin.

Luteola, lateralibus thoracis marginibus pleurisque flavis. Caput opacum immaculatum. rostro concolore. Palpi nigro-fusci, articulo primo in basi, articulis reliquis in apice luteis. Antennae dilute luteae, articulis flagelli longis, basi secundi et sequentium leviter incrassatā nigrā, ultimis totis nigris. Thoracis dorsum opacum, vittis obsoletioribus subochraceis, subfuscō marginatis et mediā per lineas duas subfuscas divisā. Scutellum et metanotum immaculata. Abdomen luteolum, nitidum, lateralibus segmentorum marginibus inaequaliter infuscatis. Hypopygium concolor. (Pedes desunt). Alae ex cinereo lutescentes, stigmate nigro-fusco. — (New York; Osten-Sacken).

29. *Pachyrrhina sodalis* nov. sp. ♀. *Caput praeter faciem et margines laterales frontis nitidum; antennarum flagellum nigrum, articulis primis ex fusco rufis; thoracis dorsum nitidum, vittis ex ochraceo fuscis; abdomen vittā mediā fuscā et utriusque serie strigularum nigrarum variegatum; alae ex cinereo lutescentes, stigmate luteo.* — Long. corp.  $8\frac{2}{3}$  lin., Long. al.  $7\frac{1}{6}$  lin.

Caput aurantiacum, praeter faciem et praeter marginem anticum et latera frontis nitidum. Rostrum concolor, in lateribus fusco-

nigrum; palpi subfuscui, articulo quarto praeter basim lutescente. Antennae nigrae, seapo ochraceo, primo vel primis duobus flagelli articulis ex fuso rufis. Thoracis dorsum nitidum, vittis latis ex fuso ochraceis, suturâ latera versus nigrâ. Sentellum et metanotum ochracea, immaenlata. Pleurae flavo et ochraceo variae. Abdomen vittâ mediâ aequali fuscâ et utrinque serie lateralî strigulatum nigrarum variegatum, segmento ultimo fere toto nigro. Terebra badia, lamellis tenuibus acutis. (Pedes desunt.) Alae ex cinereo lutescentes, cellulâ costali et stigmate luteis. — (Connecticut.)

30. *Pachyrrhina occipitalis*, nov. sp. ♀. *Occiput subnitens, nigro-fasciatum; antennarum flagellum nigrum; thoracis dorsum nitidum, vittis ex ochraceo fuscis; abdomen vittâ mediâ et utrinque strigulatis subobsoletis fuscis variegatum; alae ex cinereo lutescentes, stigmate luteo.* — Long. corp.  $6\frac{2}{3}$  lin., Long. al.  $6\frac{5}{6}$  lin.

Caput flavum, opacum, occipite subnitente, nigro-vittato. Rostrum coneolor, lateribus infuscatis. Seapus antennarum flavus, flagellum nigrum, imâ articuli primi basi flavicante. Thoracis dorsum nitidum, vittis modice latis ex ochraceo fuscis. Sentellum ochraceum; metanotum obsolete ochraceo vel subfuso vittatum. Pleurae flavo et ochraceo variae. Abdomen vittâ mediâ et utrinque strigulatis lateralibus subobsoletis ex nigro fuscis pictum. Terebra ex luteo testacea, lamellis tenuibus acutis. Pedes lutei, femoribus apicem versus fuscis, tibiis tarsisque fuso-nigris. Alae ex cinereo lutescentes, cellulâ costali et stigmate luteis. — (Hudsons Bay Territory; Kennicot.)

*Nota.* Pachyrrhinae sodali simillima, sed fronte et occipite nigro-fasciatis diversa.

31. *Pachyrrhina xanthostigma*, nov. sp. ♂ & ♀. *Occiput totum nitens, immaculatum; antennae flavae, adversus apicem obscuriores, articulis flagelli praeter primum in basi nigris; thoracis dorsum nitidum, vittis ochraceis; abdoumen vittâ mediâ tenui. interruptâ, fuscâ et utrinque strigulatis lateralibus nigris variegatum; alae ex cinereo sublutescentes, stigmate luteo.* — Long. corp.  $6\frac{2}{3}$ —8 lin., Long. al.  $6\frac{1}{3}$ —7 lin.

Caput flavum, occipite coneolore, nitido, immaculato. Rostrum coneolor, nitidum, lateribus fuscis; palpi flavi. Antennae maris mediocre, articulis flagelli infra modice excisis; seapus et primus flagelli articulus flavi, reliquum flagellum ochraceum vel ex ochraceo subfuscum, basi articulorum singulorum nigrâ. Thoracis dorsum ni-

tidum, vittis dilute ochraceis, suturâ utrinque in strigulam nigram excurrente. Abdomen vittâ mediâ tenni, interruptâ, fuscâ, in foemina valde obsoletâ et strigulis lateralibus nigris pictum. Pedes flavi, extremitate tibiarum apice tarsisque apicem versus ex fusco nigro. Alae ex cinereo lutescentes, cellulâ costali et stigmate luteis. — (Illinois.)

32. *Pachyrrhina gracilicornis*, nov. spec. ♂ & ♀. *Occiput subopacum, immaculatum; antennae tennes, mediocres, in utroque sexu aequales, fuscae, scapo primisque flagelli articulis flavis; thoracis dorsum nitidum, vittis ex fusco ochraceis; abdomen vittâ mediâ fuscâ et utrinque strigulis lateralibus nigris variegatum; alae ex cinereo lutescentes, stigmate fusco.* — Long. corp.  $5\frac{5}{6}$ — $7\frac{5}{6}$  lin., Long. al.  $6\frac{1}{2}$ — $6\frac{1}{2}$  lin.

Caput flavum, opacum, occipite subopaco, immaenlato. Rostrum concolor, nitidum, lateribus fuseis; palpi subfusci, articulo ultimo fere toto ei extremitate praecedentium apice ochraceis. Antennae tenues, mediocres, in utroque sexu aequales, fuscae, primo vel primis flagelli articulis et scapo flavis. Thoracis dorsum nitidum, vittis ex fusco ochraceis, mediâ per lineam flavicantem dissectâ. Scutellum lutescens; metanotum obsoletissime subluteo vittatum. Abdomen vittâ mediâ integrâ fuscâ et utrinque strigulis lateralibus nigris variegatum. Lamella hypopygii suprema et insimiae basis nigrae, appendices flavae. Terebra lutea, apicem versus badia, lamellis tenuibus, acutis. Pedes lutei, extremitate femorum tibiarumque apice infuscato, tarsis ex luteo fuscis, apicem versus nigro-fuscis. Alae ex cinereo lutescentes, cellulâ costali luteâ, stigmate fusco.

Nota. A *Pachyrrhina sodalis* et occipitali stigmate non luteo, sed fusco distinguitur.

33. *Spilomyia hamifera*, nov. sp. ♀. *Thorace nigro et flavo vario, abdomine flavo, maculâ basali subquadratâ fasciisque segmentorum singulorum binis nigris, alterâ basali et integrâ, alterâ mediâ et interruptâ.* — Long. corp.  $7\frac{1}{2}$ —8 lin., Long. al. 7 lin.

Caput laete flavum, fronte et facie anguste nigro-vittatis; genae vittulâ fusco-nigrâ notatae; antennae fuscae, in junioribus testaceae, margine articuli tertii fusco. Vertex niger; occiput nigricans, orbitâ polline subalbido conspersâ. Thorax niger, flavo-varius; dorsum in margine antico maculas quatuor, in dimidio posteriore vittulas duas hamatas, inde ab angulis posticis usque ad suturam pertinentes et lituras duas minutissimas, inversam literae V formam efficientes, colore

flavo pictas ostendit; in pleuris praeter humerum maculae tres laete flavae cernuntur, quarum ea, quae prope coxam anticam sita est, plerumque obsolescit. Scutellum flavum, margine basali interdum fusco vel nigro. Metanotum nigrum utrinque maculam flavam habet. Abdomen flavum; segmentum primum praeter angulos laterales nigrum; segmenta sequentia singula fascias binas angustas nigras habent, alteram margini antico contiguam et integrum, alteram medianum et interruptam. Venter niger, margine segmentorum singulorum postico flavo. Pedes flavi, tibiis tarsisque anticis nigris. Alarium dimidium anterius fuscum, posterius hyalinum. — (Pennsylvania; Osten-Sacken.)

Nota. *Spilomyiae* genus cellulâ marginali clausâ a Milesiis, femoribus posticis dentatis a *Tennostomis* distinguitur.

34. *Spilomyia fusca*, nov. sp. ♂ et ♀. *Nigro-fusca, facie, thoracis maculis vittulisque, scutelli margine et fasciis in abdominis apice tribus dilute sulphureis*. — Long. corp.  $6\frac{1}{6}$ —7 lin., Long. al.  $5\frac{1}{2}$ — $6\frac{7}{8}$  lin.

Caput dilute sulphureum, vertice, vittulâ faciei incompletâ et vittulâ frontali supra abbreviatâ nigro-fuscis; antennae fuscae, articulis duobus primis saepe nigris; occiput nigrum, orbitâ albopollinosâ. Thorax ex nigro fuscus; dorsum in margine antico maculas quatuor, in dimidio posteriore lineas duas hamatas, inde ab angulis posticis usque ad suturam pertinentes, et strigulas duas dimidiâ circuli formam efficientes, colore dilute sulphureo pictas habet; in pleuris maculae tres dilute sulphureae cernuntur. Scutellum nigro-fuscum, margine postico dilute sulphureo. Abdomen nigro-fuscum, breviter nigro-pilosum; segmenti secundi margo posticus angustissime flavescit; segmentum tertium limbum marginis postici aequalem et utrinque fasciae mediae initium breve dilute sulphurea ostendit; segmentum quartum fasciam anguste interruptam et limbum marginis postici latiusculum sulphureos habet. Hypopygium maris totum sulphureum. Venter ex nigro fuscus, incisuris dilute flavescentibus. Femora fusca, testaceo et sulphureo varia; tibiae anticae praeter basim sulphuream fuscae, posteriores sulphureae, apice tamen ochraceo; tarsi antici fusi, posteriores ochracei. Alae subhyalinae, in dimidio anteriore fusco-literatae. — (Pennsylvania; Osten-Sacken.)

35. *Tennostoma obscura*, nov. sp. ♂. *Nigra, abdominis segmentis singulis flavo unifasciatis, facie subtuberculatâ*. — Long. corp.  $4\frac{1}{2}$  lin., Long. al.  $4\frac{1}{3}$  lin.

Caput tomento subaureo ornatum, vertice, maculâ triangulari supra antennas, vittâ latâ faciei genisqne atris, antennis fuscis. Thorax ater, humeris, suturâ, puncto utrinque supraalari minutissimo pleurarumque strigulâ flavo-pollinosis. Scutellum pieco-nigrum, subopacum. Abdomen atrum, modice nitens, segmentis singulis praeter primum fasciam aequalem, integrum, modice arcuatam, flavo-pollinosam, utrinque colore atro opaco limbatam gerentibus. Hypopygium atrum, niteus. Pedes antici nigri, genibus luteis; pedes intermedii lutei, femoribus praeter apicem nigris, tibiarum apice obsolete subfuscō, ultimis tribus tarsorum articulis fuscis; pedes postici lutei, femoribus praeter apicem et imam basim nigris, tibiarum dimidio apicali et ultimis tribus tarsorum articulis fuscis. Alae cinereae, obsolete sublituratae. — (Saskatchevan; Kennicot.)

**Nota.** A *Temnostoma bombylanti*, cui simillima, faciei tuberculo minuto quidem, sed manifesto differt.

36. *Temnostoma aequalis*, nov. sp. ♂. *Nigro et flavo varia, segmentis abdominalibus singulis flavo bifasciatis, fasciâ interjectâ nigrâ in ultimo segmento anguste interruptâ, pedibus anticis posteriorumque femoribus nigris.* — Long. corp.  $5\frac{1}{2}$  lin., Long. al. 5 lin.

Caput tomento subaureo vestitum, lineâ frontali, vittâ faciali genisque atris, antennis subfuscis; triangulum verticale nigrum, infra flavo-pollinosum. Thorax ater, humeris, suturâ, puncto supraalari utrinque et vittulâ pleurarum flavo-pollinosis. Scutellum nigro-aeneum, nitidum. Abdomen nigrum, modice nitens, segmentis singulis praeter primum fascias binas flavo-pollinosas, integras et in laterali abdominis margine non contiguas gerentibus; fascia anterior segmentorum singulorum a margine antico intervallo atro opaco separatur et postice limbum atrum opacum habet; fasciae segmenti quarti per vittulam medianam flavo-pollinosam conjunguntur. Hypopygium piecum. Pedes antici nigri, genibus luteis; pedes posteriores lutei, femoribus praeter apicem nigris, ultimo tarsorum articulo fusco. Alae cinereae, obsoletissime lituratae. — (English River; Keanicot.)

37. *Temnostoma alternans*, nov. spec. ♂ et ♀. *Nigro et flavo varia, segmentis abdominalibus singulis flavo bifasciatis, fasciâ interjectâ nigrâ in ultimo foeminae et in duobus ultimis maris segmentis in maculas tres dissectâ, femorum anteriorum basi, tibiis tarsisque anticis nigris.* — Long. corp.  $6\frac{5}{12}$  —  $7\frac{2}{3}$  lin., Long. al.  $5\frac{1}{2}$  —  $6\frac{1}{3}$  lin.

Caput tomento subaureo vestitum, vertice, vittâ frontali infra abbreviatâ, vittâ faciei integrâ genisque atris, antennis luteis. Thorax niger, humeris, maculis utrinque binis in suturâ sitis, vittulâ utrinque laterali inde ab angulo postico usque ad suturam pertinente et maculâ posticâ triangulâ tomento flavo tectis. Pleurae maculâ magnâ flavo-pollinosâ notatae. Scutellum nigro-aeneum, nitidum. Abdomen atrum, opacum, segmentis singulis praeter primum fascias binas laete flavas, ad latera abdominalis conjunctas gerentibus; segmentum secundum utriusque sexus fascias anteriorem anguste, posteriorem late interruptas habet; fascia anterior segmenti tertii in utroque sexu anguste interrupta est; posteriorem, quae in foemina anguste interrupta cernitur, mas integrum et praeter latera cum anteriore bis conjunctam habet; segmentum quartum foeminae fasciam anteriorem anguste interruptam, posteriorem emarginatam habet; in mare hae fasciae latiores et praeter latera bis conjunctae sunt, ita ut fascia interjecta atra in maeulas tres dissolvatur; segmentum quintum foeminae similem pieturam quam quartum maris habet. Hypopygium luteum. Pedes lutei, femorum anteriorum basi ex fusco nigrâ, tibiis anticis praeter basim tarsisque anticis totis nigris. Alae in dimidio anteriore subfuscâ lituratae. — (Philadelphia.)

38. *Lepidomyia calopus*, nov. sp. ♀. *Nigra, squamulis albidis rare aspersa, basi tibiarum tarsorumque articulis primis duobus albis, alis nigro-maculatis.* — Long. corp.  $2\frac{1}{2}$  lin., Long. al.  $2\frac{1}{2}$  lin.

Nigra, nudiuscula, subnitida. Frons plana, infra latior, lineâ mediâ impressâ subobsoletâ et utrinque maculis binis albido-pollinosis instructa. Antennae angustae, faciei subaequales; artieuli primi duo testacei, secundus primo paulo longior et supra fuscus; artieulus tertius elongatus, niger, basi infra testaceâ, setâ basali, nudâ, fuscâ. Thorax cum scutello et pleuris squamulis minutis albidis rare, sed aequaliter aspersus. Abdomen planum, lateribus et apice albo-squamulosis, disco squamulis destituto. Pedes atri, nitidi, subcyanescentes, tibiarum basi primisque duobus tarsorum articulis albis; femora omnia crassa, infra duplii serie spinularum nigrarum armata; tibiae subclavatae, postieac modice arcuatae. Alae hyalinæ, nigro-maculatae. (Cuba; Gundlach.)

Nota. Principales generis Lepidomyiae notae hae sunt: Corpus pro portione brevinsulum et latiusculum, nudum, squamulis minutis aspersum. Facies in medio tuberculata. Antennae faciei aequales, articulo tertio duobus praecedentibus simul sumtis

duplo longiore, aequali, setâ basali tenuissimâ, nudâ. Femora omnia valde incrassata et infra spinosa; tibiae et tarsi crassi. Cellula alarum marginalis aperta; venula transversa media subnormalis; margo apicalis cellulae posteriores primae in medio sinuatus, angulo postico rotundato, antico acuto et prope ad marginem alae ducto.

39. *Xylota bicolor* nov. sp. ♂. *Nigra, albido-pubescent, ab domine praeter segmentum primum toto rufa, tibiarum anteriorum basi, primo tarsorum anticorum primisque duobus intermediorum articulis albidis.* — Long. corp.  $5\frac{1}{4}$  lin., Long. al. 4 lin.

Caput nigrum, albo-pollinosum, fronte valde projectâ. Antennae nigrae, articulo tertio rotundato ovato, paulo longiore quam latiore, setâ dilute ferrugineâ, apicem versus fuscâ. Triangulum verticale nigrum nitidum, pilis albidis vel ex flavo albidis vestitum. Thorax niger, obsoletissime aenescens, pube dorsi subflavante, pleurarum albidâ. Scutellum thoraci concolor, pube exalbidâ vestitum. Primum abdominis segmentum nigrum, reliquum abdomen totum rufum, fulvo-pubescent. Hypopygium concolor, fulvo-pilosum. Venter rufus, primo segmento tamen nigro. Pedes nigri, albido-pilosuli, coxis posticis inermibus, femoribus posticis modice crassis, tibiarum anticarum basi, primo tarsorum anticorum primisque duobus intermediorum articulis albidis. Alae ciuereae, dimidio basali hyalino, stigmate fusco. — (Illinois; Osten-Sacken.)

Nota. *Xylota bicolor* a *Xylotâ haematode* Wied., quam eandem ac *Xylotam* pigram Fabr. esse persuasum habeo, oculis longius contiguis, pube totius corporis longiore, secundo abdominis segmento immaculato, hypopygio non pieceo, sed rufo, femoribus posticis minus incrassatis, tibiarum denique anticarum basi, primo tarsorum anticorum primisque duobus intermediorum articulis albidis differt.

40. *Xylota barbata* nov. sp. ♀. *Latiuscula, thorace cupreoneo-aeneo, ab domine cyaneo-nigro, nigro-pilosulo, segmento primo sequentiumque sequentium singulorum fasciâ chalybeâ, nitidâ, albopilosâ, pedibus nigris, tibiarum posteriorum basi, tibiis anticis fere totis primisque tarsorum anticorum articulis ex fusco testaceis.* — Long. corp.  $5\frac{1}{2}$  lin., Long. al.  $5\frac{1}{4}$  lin.

Caput latum, nigrum. Frons modice projecta, nigro-pilosa. Primi duo antennarum articuli nigri, tertius nigro fuscus, subrotundus, setâ nigrâ. Facies mediocriter excavata, albido-pollinosa. Barba

albida, paulo longior quam in *Xylotis* plerisque. Thoracis dorsum obscure cupreo-aeneum, modice nitens, albido-pilosum; pleurae aeneo-nigrae, nitidae, albo-pilosae. Scutellum viridi aeneum, albo-pilosum. Abdomen latiusculum, cyaneo-nigrum, subopacum, pilis brevissimis nigris vestitum, segmento primo toto chalybeo, nitido, albo-piloso; segmentum secundum fasciam chalybeam, nitidam, latissimam, subintegralm, pilis albis vestitam habet; segmenta sequentia duo singula prope marginem anticum fasciam similem, sed interruptam et minus latam gerunt. Pedes nigri, albido-pilos; femora in apice nigro-pilosula, postica non incrassata; tibiae anticae ex fusco testaceae, tomento lateris antici subfulvo; tibiarum posteriorum basis et primi duo tarsorum anticorum articuli ex fusco testacei, tarsi omnes iufra fulvo-tomentosi. Alae cinereae, dimidio basali hyalino, stigmate nigro-fusco, venis nigris. — (Sitka.)

41. *Xylota fraudulosa* nov. sp. ♂ et ♀. *Nigro-viridis, abdome flavo-quadrivirgato, coxis posticis maris nec dentatis nec tuberculatis.* — Long. corp. 3½ lin., Long. al. 3 lin.

Caput nigrum, fronte foeminae aeneo-viridi; antennae fuscae, articulis priniis duobus ex fusco nigris, basi setae nigricantis lutea; frons modice prominens et facies modice excavata. Thorax aeneo-viridis, nitens, vittis quatuor dorsalibus ex cupreo scoriaceis. Scutellum cum thorace concolor. Primum abdominis segmentum nitidum, subaeneum; sequentia duo atra, praeter margines laterales opaca, utrumque maculis binis flavis quadratis ornatum, quae maculae in mare cum marginibus lateralibus cohaerere, in foeminâ ab his separatae esse solent; segmentum quartum aeneo-viride, nitidum, in foeminâ interdum ex viridi scoriaceum; segmentum quintum foeminae et hypopygium maris cum segmento praecedente concolora. Venter flavus, segmento quarto ex nigro fusco. Pedes nigri, subvirescentes, genibus, tibiarum anteriorum basi, primis duobus vel tribus tarsorum anticorum tribusque intermediorum articulis dilute flavicantibus, intermediis tarsorum posticorum articulis haud raro fuscis vel subfuscis; femora postica valde incrassata; coxae posticæ in utroque sexu inernes. Alae subhyalinæ, ex fusco cinereae, stigmate subfusco. — (Illinoian, Wisconsin; Osten-Sacken.)

Nota. *Xylotae bifasciatae* Meig. simillima, at paulo minor et pnbre breviore vestita est, nec setam antennarum totam nigram, sed in basi luteam habet.

42. *Chrysotoxum laterale* nov. sp. ♂. *Pedibus totis flavis, alarum limbo costali fusco, aequali.* — Long. corp.  $5\frac{1}{3}$  lin., Long. al.  $5\frac{1}{6}$  lin.

Antennarum articulus secundus primo longior, margine apicali testaceo; articulus tertius praecedentibus simul sumtis paulo longior. Oculi hirti. Laterales thoracis vittae subintegrae, vittulae albido-pollinosae conspicuae. Sentellum flavum, fasciolâ disci nigricante. Flavae abdominis fasciae mediocres, areuatae, angustissime interruptae, cum limbo flavo marginis lateralis connexae; margo segmentorum singulorum posticus flavus, segmenti primi angustus, tertii latus, quarli valde dilatatus, quinti in maculam oblongam productus, ita ut inter hanc maculam et fasciam Y inversum colore nigrum pictum sit. Hypopygium flavum. Media ventris segmenta singula fasciam areuatam anguste interruptam et marginem posticum flavos habent. Pedes toti flavi. Alae cinereo-hyalinae, fuso costae limbo angusto et aequali. — (Nebraska.)

Nota. A *Chrysotoxo* derivato Walk., cui affine, vitta thoracis laterali latiore, margine abdominis flavo, picturâ ventris laetiore pedibusque totis flavis facile distinguitur.

43. *Chrysotoxum pubescens* Loew ♂ et ♀. *Pedibus totis flavis, alis adversus costam lutescentibus.* — Long. corp. 6 lin., Long. al.  $5\frac{7}{12}$  lin.

Syn. *Chrysotoxum pubescens* Loew, Wien. Monatschr. IV, 84.

Secundus antennarum artieulus primo longior, tertius duobus praecedentibus simul sumtis in foeminâ subaequalis, in mare longior. Oculi hirti. Laterales thoracis vittae interruptae, vittulae albido-pollinosae conspicuae. Sentellum flavum, disco nigro. Flavae abdominis fasciae mediocres, areuatae, interruptae, in angulis segmentorum posticis cum limbo marginis postici connexae; hi limbi in segmentis posterioribus latiores sunt quam in praecedentibus; limbus segmenti ultimi in maculam triangulam dilatatur, ita ut inter hanc maculam et fasciam V inversum colore nigro inscriptum sit. Venter niger, segmentis postice flavo-marginatis, duobus intermediis in mare, ultimis tribus in foeminâ maculas binas ovatas gerentibus. Hypopygium flavum. Pedes flavi. Alae cinereo-hyalinae, adversus costam lutescentes. — (Illinois; Osten-Sacken.)

44. *Chrysotoxum ventricosum* nov. sp. ♀. *Oculis hirtis, scutello toto flavo, abdominis globosi fasciis mediocribus, modice areuatis, a margine lateralâ et marginis postici limbo anguste se-*

*paratis vel subseparatis, femorum anteriorum basi femoribusque posticis praeter apicem nigris, — Long. corp. 5 lin., Long. al. 5 $\frac{1}{6}$  lin.*

Tertius antennarum articulis duobus praeecedentibus simul sumtis paulo longior. Oculi hirti. Laterales thoracis vittae interruptae. Scutellum totum flavum. Abdomen globosum, fasciis mediocribus, modice arcuatis, anguste interruptis, a margine laterali et a limbo marginis postici plerisque separatis, interdum per maculam luteam in postico segmenti angulo sitam cum utroque conjunctis; posticus segmenti primi margo limbum flavum aut nullum aut angustissimum habet; limbi segmentorum sequentium mediocres, ultimi in maculam triangulam dilatatus, per Y nigrum inversum a fasciâ separatam. Ultima tria ventris segmenta singula fasciam mediocrem, latissime interruptam et limbum posticum flavos habent. Pedes flavi, basi femorum anteriorum femoribusque posticis excepto apice nigris. Alae cinereae, fusco costae limbo aequali. — (Washington.)

Nota. Chrysotoxum ventricosum a foeminâ Chrysotoxi areuati Linn. (hortensis Meig.), cui sinillum, basi abdominis nigropilosâ facile distinguitur.

. 45. *Microdon tristis* nov. sp. ♀. *Niger, pallide pilosus, antenuis longis fusco-nigris, fronte latissimâ, scutello bidentato, abdominis oblongo-ovati segmento paenultimo duobus praecedentibus simul sumtis subaequali. — Long. corp. 4 $\frac{1}{2}$  lin., Long. al. 3 $\frac{1}{2}$  lin.*

Caput aeneuni nigrum, pilis ex flavo albidis vestitum. fronte latissimâ, aequali. Antennae elongatae, nigro-fuscae, articulo primo linearis, tertio subaequali, in basi testaceo. Thorax aeneo-niger, obsolete cupreo-lineatus, pilis flavescentibus vestitus. Scutellum viridinigrum, albido-pilosum, planiusculum, apice emarginato et utrinque dente minuto concolore armatum. Abdomen oblongo-ovatum, punctatum, nigrum, segmento paenultimo duobus praeecedentibus simul sumtis subaequali, basi marginibusque lateralibus flavo-pilosis pilisque albidis in disco ita dispositis, ut fascia late interrupta in postico segmenti tertii margine, plagae duae magnae separatae in segmento quarto duaeque minores subcontiguae in segmento quinto pilis albidis vestitae apparent. Venter flavo-pilosus, nigro-picens, marginibus posticis segmentorum singulorum dilute flacieantibus. Pedes nigro-picci, femorum-basi, genibus et basali tibiarum posticarum dimidio dilute testaceis; tarsi nec dilatati nec incrassati. Alae cinereae, limbis venarum transversalium nigricantibus angustis, angulis posticis cellularum posterioris primae et discoidalis rotundalis, non appendiculatis. — (Virginia)

**46. *Microdon laetus* nov. sp. ♂ et ♀.** *Laete viridis, chalybeo et violaceo splendens, oculis hirtis, fronte et facie angustis, ocellis a vertice remotis, antennis brevibus nigris, tibiis maris flavis, foeminae nigricantibus.* — Long. corp. 4 lin., Long. al.  $3\frac{1}{2}$  lin.

Corpus gracile, laete viride, nitidum. Caput chalybeum; facies angusta, aequalis, pilis dilutissime flavis, prope antennas pilis nigris vestita. Antennae capite breviores, nigrae, articulo tertio primi longitudinem paulo excedente. Frons angusta, nigro-pilosa, in mare supra antennas coaretata, in foeminâ aequalis; ocelli in utroque sexu a vertice remoti. Thoracis dorsum chalybeo et enpreo splendens, plagâ discoidalî cupreо-circumscriptâ ornatum, nigro-pilosum, margine antico angulisque posticis tamen pallide pilosis. Scutellum nigropilosum, subconvexum, apice emarginato et utrinque denticulum nigrum gerente. Abdomen maris cylindricum, adversus apicem chalybescens; abdomen foeminae minus convexum, praeter margines fere totum violaceum. Femora chalybea; tibiae maris descripti flavae, foeminae nigricantes et chalybeo micantes; tarsi utriusque sexus nigri. Alae cinereae, limbis nigricantibus venarum transversalium angustis, subobsoletis, angulis posticis cellularum posterioris primae et discoidalis rotundatis, non appendiculatis. — (Cuba; Gundlach.)

**Not a.** *Microdon laetus* *Microdoni brevicorni* Lw. similis et aequalis est, sed oculis hirtis, abdome minus lato et tibiis multo graciliорibus differt.

**47. *Microdon coarctatus* nov. sp. ♂ et ♀.** *Gracilis, chalybeoviridis, modice nitens, oculis subnudis, fronte et facie angustis, ocellis a vertice remotis, antennis brevibus nigris, segmenti abdominalis secundi marginibus tumidis.* — Long. corp.  $3\frac{1}{2}$  — 4 lin., Long. al. 3 lin.

Gracillimus, chalybeo-viridis, modice nitens, albido-pubescent. Frons aequalis, angusta, foeminae paulo latior quam maris, ocellis a vertice remotis. Antennae nigrae, breves, articulo tertio praeceedentibus simul sumtis paulo longiore. Thoracis dorsum aeneo-viride, subtilissime punctulatum et transversim aciculatum, vittis quatuor obscure cupreis. Scutellum ex viridi nigrum, apice emarginato et utrinque denticulo nigro instructo. Abdomen maris cylindricum, obtusum, foeminae acutum; segmentum secundem paulo latius quam sequentia, disco depresso, marginibus lateralibus quasi tumidis. Alae cinereo-hyalinae, venarum transversalium limbis nigris, angulis posticis cellularum posterioris primae et discoidalis rotundatis, brevisime appendiculatis. — (District Columbia; Osten-Sacken.)

48. *Ceria abbreviata* nov. sp. ♂. *Nigra, flavo varia, pedunculo antennarum longo, abdominis cylindrici segmentis primis duobus solito brevioribus, costali alarum dimidio fusco.* — Long. corp.  $4\frac{1}{2}$  —  $4\frac{3}{4}$  lin., Long. al.  $3\frac{1}{2}$  — 4 lin.

Ceriac conopsoidi simillima. Nigra subopaca. Occiput nigrum; vertex praeter angulum ocelliforme flavus; frons flava. vittâ nigrâ; facies flava, vittâ tenui, lineâ transversâ genisque nigris. Antennae nigrae, pedunculo fusco, elongato. Thorax niger, punctatus, humeris, maculâ utrinque laterali minutâ pleurarumque maculâ didymâ flavis. Scutellum flavidum, basi nigrâ, margine apicali fusco. Abdomen cylindricum, praeter posticos segmentorum margines serobiculatum, atrum, lateribus segmenti primi marginibusque posticis segmentorum secundi et quarti latius, tertii angustius flavis. Hypopygium atrum. Pedes interdum nigri, femorum basi fuscâ, genibus et imâ tibiarum basi flavis, saepius nigro-fusci inveniuntur, femorum basi et apice tibiarum tarsisque anterioribus testaceis vel ex fusco testaceis, genibus tibiarumque basi flavis. Alae hyalinae, dimidio costali adversus basim dilutius, adversus apicem saturatius fusco. — (Pennsylvania.)

Nota. *Ceria abbreviata* secundum abdominis segmentum multo brevius quam *Ceria conopsooides* habet.

49. *Empis laevigata* nov. sp. ♂. *Nitida, tota atra, nigro-pilosa; oculi contigui; halterum capitulum flavescentia; alae dilute subfuscæ, stigmate paulo saturatiore, subosculo; hypopygium clavatum, filamento centrali obtecto; venter ante hypopygium apophysibus duabus aduncis instructus.* — Long. corp.  $3\frac{3}{4}$  lin., Long. al.  $3\frac{1}{4}$  lin.

Tota atra, nitida, nigro-pilosa. Oculi contigui. Antennae tenues, nigrae. Proboscis nigra, supra ex parte fusca, tibiis anticis longior. Thoracis dorsum nigro-pilosum, polline cinerascente obsoletissime aspersum. Scutellum convexum, praeter setas marginales sex nudum. Pleurae et coxae cinereo-pollinosae, subopacae. Abdomen nigro-pilosum. Hypopygium desflexum, clavatum, filamento centrali obtecto. Venter ante hypopygium apophyses duas incurvas, pilis nigris barbatas habet. Pedes simplices, tenues, pilis brevibus setisque tenuibus nigris vestiti. Halterum capitulum flavescentia. Alae dilute subfuscæ, stigmate subfuscâ, venis fuscis. — (New Hampshire; Osten-Sacken.)

50. *Empis stenoptera*, nov. sp. ♂ et ♀. *Tenuis, nudinclusa, opaca, ex albo cinerascens, vittis quatuor thoracis subfuscis;*

*antennae nigrae; proboscis brevis; pedes graciles, fusci, femorum tibiarumque basi lutea. tarsis nigris; alae angustae, cinereo-hyalinae, venis nigro-fuscis, stigmate obsoleto.* — Long. corp.  $1\frac{1}{2}$  lin., Long. al.  $2\frac{5}{8}$  lin.

Tennis, nudiuscula, opaca, ex albo cineraceens, abdomine foeminae minus albicante. Caput concolor. Oculi maris separati. Antennae tenuissimae, nigrae. Proboscis nigra, capite longior, sed femoribus anticis brevior. Thoracis dorsum subfuscus quadriguttatum, vittis intermediis postice, lateralibus antice valde abbreviatis. Hypopygium maris clausum, nigrum, lamellis inferis testaceis, filamento centrali obtecto. Coxae albido-cinereae, apicem versus dilute lutescentes. Pedes graciles, fusi, femorum basi et latere infero tibiarumque basi luteis, tibiis apicem versus tarsisque totis nigris. Halteres dilute flavescentes. Alae angustae, cinereo-hyalinae, stigmate obsoleto, venis fuscis. — (New Hampshire; Osteu-Sacken.)

51. *Empis longipes* nov. sp. ♂. *Flava, untennis gracilibus nigris, capite et dorso thoracis cinereis, hoc fusco-quadrivittato, abdominis vittâ mediâ segmentorumque singulorum marginibus posticis nigricantibus, tarsis uigris; hypopygium flavum, filamento centrali crassissimo, praeter basim obtecto; alae ex luteo cinereae, stigmate concolore, obsoletissimo.* — Long. corp.  $2\frac{3}{4}$  lin., Long. al.  $3\frac{1}{4}$  lin.

Tennis. nudiuscula, flavicans, supra obscurior. Caput nigrum, polline albo cinereum. Frons angustissima. Antennae tenuissimae, nigrae, stylo terminali mediocri. Proboscis primis duobus tarsorum articulis sinuul sumtis subaequalis. Thorax lutescens; dorsum cinereum, opacum, vittis quatuor angustis fuscis, intermediis postice, lateralibus antice valde abbreviatis, pilis minutis setisque nigris rarissimis. Scutellum lutescens. Abdomen nitidum, luteum, vittâ mediâ segmentorumque singulorum marginibus posticis nigricantibus. Hypopygium mediocre, flavum, ringens, apice nigro-barbato, filamento centrali crassissimo, concolore, praeter basim obtecto. Pedes longi, graciles, flavi, breviter nigro-pilosuli, tarsis ex nigro fuscis, articulis primis in apice, reliquis totis nigris. Alae ex luteo cinereae, venis ex fusco luteis, stigmate concolore, obsoletissimo. — (Lake George N. Y.; Osten-Sacken.)

52. *Empis rufescens* nov. sp. ♂. *Flavo, supra rufescens, capite cinereo, primis tarsorum articulis in apice, reliquis totis nigris; oculi subcontigni; hypopygium longiusculum, ascendens, fila-*

mento centrali longo, exerto; alae ex luteo cinereae, stigmate dilutissime subfuscō. — Long. corp.  $3\frac{1}{2}$  lin., Long. al.  $3\frac{1}{3}$  lin.

Flava, supra rufescens. Thorax subopacus, abdomen nitidum. Caput nigrum, polline albo cinereum. Oculi in fronte subcontigui. Antennae mediocres, validiusculae, artielis primis duobus rufis, tertio nigro, stylo terminali mediocri. Proboscis flava, tibiis anticis longior. Thoracis dorsum pilis setisque raris nigris instructum. Hypopygium flavum, longiusculum, ascendens, clausum, lamellis inferis elongatis, superis parvis, breviter ovatis, filamento centrali exerto, infero, tenui, arcuato, flavo. Pedes graciles, pilis setulisque brevibus nigris vestiti, flavi, articulis tarsorum primis duobus in apice, ultimis tribus totis nigris. Alae ex luteo cinereae, venis fuscis, adversus costam et basim ex fusco luteis, stigmate dilutissime subfuscō. — (New Hampshire; Osten-Sacken.)

53. *Rhamphomyia umbrosa* nov. sp. ♂ et ♀. *Nigra, nigro-pilosa; hypopygium parvum, ascendens, upice badio, filamento centrali mire incrassato, atro, praeter basim obtecto; alae ex fusco nigrae, basi lutescente.* — Long. corp.  $2\frac{3}{4}$  lin., Long. al.  $3-3\frac{1}{2}$  lin.

Tota nigra, nigro-pilosa, supra polline cinereo leviter aspersa. Oculi contigni. Antennae mediocres, nigrae, articuli secundi marginē apicali obsolete fusco, articulo tertio oblongo-lanceolato, stylo terminali brevissimo. Proboscis nigra, femoribus anticis aequalis; palpi concolor. Abdomen compressum; hypopygium parvum, ascendens, clausum, nigrum, apicem versus badium; filamentum centrale inferum, crassissimum, atrum, nitidum, praeter basim obtectum. Pedes simplices, pilis setisque nigris instructi. Halteres ex luteo subfuscī. Alae ex fusco nigrae, basi lutescente, stigmate nigro; alae foeminae modice dilatatae. — (New Hampshire; Osten-Sacken.)

54. *Rhamphomyia basalis* nov. sp. ♀. *Cinerea, ventre, coxis pedibusque dilute lutescentibus, tibiis apicem versus tarsisque totis ex nigro fuscis, tibiis posticis breviter squamato-ciliatis; alae dilatatae, nigrae, basi hyalinā.* — Long. corp.  $2-2\frac{1}{2}$  lin., Long. al.  $2\frac{5}{6}$  lin.

Cinerea, opaca. Caput ex albo cinereum; antennae nigrae, longiusculae, angustae, articulis primis duobus breviter nigro-pilosae, articulo tertio oblongo-lanceolato, stylo terminali mediocri. Proboscis fusca, femoribus anticis paulo brevior. Thoracis dorsum subfuscō obsolete trivittatum, pilis brevibus setulisque raris nigris instructum. Abdomen ex fusco cinereum, subnitens, ventre fere toto

pallido; stylinales longinseuli, lineares. Coxae et pedes dilute lutescentes; femora apicem versus obsolete subfuscatae; tibiae adversus apicem nigro-fuseae, posticae leviter compressae, utrinque pilis nigris modice dilatatis ciliatae. Halteres exalbidi. Alae valde dilatatae, nigrae, basi hyalinâ, stigmate obsoletissimo — (New Hampshire; Osten-Sacken.)

55. *Rhamphomyia macilenta* nov. sp. ♂. — *Cinerea, opaca, thorace obsoletissime vittato, abdomine nigro, nitido, hypopygio parvo concolore, filamento centrali crasso, praeter basim obtecto; oculi separati; antennae longae, nigrae; pedes lutei, extremo tibiarum apice infuscato, tarsis ex fusco nigris, femoribus infra nigro-setulosis; halterum capitulum albicans; alae angustae, cinereo-hyalinae, stigmate subfusco, venis fuscis.* — Long. corp.  $2\frac{5}{8}$  lin., Long. al.  $2\frac{7}{8}$  lin.

Maera, cinerea, opaca, nudiuscula. Caput concolor, oculis per frontem latam separatis. Antennae longae, tenues, nigrae, articulis primis duobus breviter nigro-pilosus, tertio sublineari, stylo terminali mediocri. Proboscis fusca, femoribus anticus brevior; palpi lutei, apice fusco. Thoracis dorsum vittis obscurioribus obsoletissimis vel nullis, pilis setisque nigris brevibus et rariss. Abdomen nigrum, nitidum, supra pilis nigris, utrinque et infra pallidis vestitum. Hypopygium nigrum, parvum, lamellis omnibus brevibus, ovatis, breviter nigro-pilosus, filamento centrali crassissimo, prater basim obtecto. Coxae luteae, anticae basim versus subfuscatae. Pedes lutei, breviter nigro-pilosus, femoribus infra nigro-setulosis, extremo tibiarum apice infuscato, tarsis ex fusco nigris. — Alae angustae, cinereo-hyalinae, stigmate subfusco, venis fuscis, basim versus lutescentibus. — (New Hampshire; Osten-Sacken.)

Nota. Foeminam unam possedeo, quae fortasse uxor Rhamphomyiae macilentae est, sed a mare, quem descripsi, differt vittis dorsalibus tribus distinctis et capitulo halterum fusco. Altera foemina cum hac congruit quidem, sed et coxas omnes praeter apicem infuscatas et femorum apicem fuscum habet; tibiarum color jam inde a medio in fuscum abit. Pili pedum utriusque foeminae non differunt, nec alii sunt, quam quales in foeminâ ejus modi maris expectaveris. Duae aliae foeminae ab eâ, quam altero loco notavi, non recedunt nisi alis magis obscuratis palpisque nigro-fuscis.

56. *Rhamphomyia rustica* nov. sp. ♂ et ♀. *Capite, thorace non vittato scutelloque cinereis, abdomine lutescente, segmentis vel posticis vel omnibus praeter marginem posticum piceis vel nigris; antennae flavae, articulo tertio praeter basim nigro; coxae lutescentes, rarius excepto anticorum apice piceae; pedes antici lutei, tarsis nigris; pedes postici in speciminibus maturis toti nigri, in immaturis ex parte, interdum maximâ ex parte dilute lutescentes.*

*♂. oculi contigui; filamentum centrale hypopygii flexuosum, prope basim fractum.*

*♀. styli anales longiusculi, lineares.*

Long. corp.  $2\frac{1}{6}$ — $2\frac{1}{3}$  lin., Long. al.  $2\frac{5}{12}$ — $2\frac{7}{12}$  lin.

Caput obscure cinereum, nigro-pilosum, oculis maris contiguis. Antennae graciliores, dilute flavescentes, articulo tertio praeter basim nigro, stylo terminali mediocri. Proboscis fusca, coxis anticis paulo longior; palpi lutei, apice obscure fusco, interdum toti fuscii. Thorax cinereus, vittis obscurioribus nullis, pilis setisque raris nigris. Scutellum concolor. Abdomen in speciminibus nuper exclusis luteolum, segmentis ultimis praeter marginem posticum piceis; specimina matura praeter margines segmentorum singulorum posticos totum abdomen nigrum habent. Coxae plerumque lutescentes, non nunquam solo anticarum apice excepto piceae; pedes antici lutescentes, femorum basi, tibiarumque apice interdum infuscatis, tarsis semper nigris; pedes posticos specimina matura totos nigros, immatura saepe maximâ ex parte lutescentes habent, tibiarum apice tamen tarsisque semper obscuro. Halteres dilute flavescentes. Alae cinereo-hyalinae vel cinereae, venis fuscis et stigmate subfuscō; basis venae tertiae plerumque umbrâ subfuscâ circumfusa est. — (New Hampshire; Osten-Sacken.)

57. *Rhamphomyia luteiventris*, nov. sp. ♂. *Cinerea, vittis thoracis tribus nigricantibus, abdomine supra nigro, infra dilute flavicante, coxis pedibusque flavicantibus, tibiis anterioribus in apice subfuscis, posticis exceptâ basi tarsisque omnibus nigris; oculi contigui; antennae nigrae, articulo secundo fusco; proboscis coxis anticis paulo longior; hypopygium nigrum, lamellis intermediis subovatis, superis lanceolatis, porrectis, filamento centrali flexuoso; alae cinereo-hyalinae. — Long. corp.  $2\frac{1}{4}$  lin., Long. al.  $2\frac{1}{4}$  lin.*

Caput obscure cinereum, oculis contiguis. Antennae graciles, nigrae, articulis primis duobus breviter nigro-pilosis, secundo praeter basim fusco, stylo terminali breviuscule. Proboscis fusca, coxis anticis paulo longior. Thorax cinereus, opacus, vittis tribus nigris

subobsoletis, pilis setisque raris nigris. Scutellum concolor. Abdomen supra nigrum, nitidum, utrinque et infra dilute flavescens. Hypopygium mediocre, nigrum, ringens, lamellis intermediis subovatis, obtusis, superis lanceolatis, porrectis, omnibus nigro-pilosis, filamento centrali luteo, tenui, flexuoso, prope basim non fracto. Pedes cum coxis dilute flavicantes, nigro-pilos; tibiae anteriores in apice nonnihil fuscescens; tibiae posticae praeter basim et tarsi omnes nigri. Halteres dilute flavicantes. Alae cinereae, venis fuscis, stigmate subfuscō. — (New Hampshire; Osten-Sacken.)

Nota. A *Rhamphomyia* mutabili ventre pallido, coxis dilutioribus et oculis maris contiguis differt.

58. *Rhamphomyia nigricans* nov. sp. ♂. *Tota nigra, opaca, nigro-pilosula, thorace et abdōmine polline albido cinerascentibus; oculi contigui; proboscis mediocris; alae hyalinae, venis tenuibus fuscis, stigmate subobsoleto; hypopygium nigro-pilosum, filamento centrali flexuoso.* — Long. corp.  $1\frac{1}{2}$  lin., Long. al.  $1\frac{1}{2}$  lin.

*Tota nigra*, antennis, proboscide, palpis, halteribus pedibusque concoloribus. Caput nigro-pilosum; oculi contigui; antennae tenues; proboscis coxis anticis longior. Thorax polline raro albido subcinerascens. vittis tribus obscurioribus obsoletis, nigro-pilosus. Scutellum concolor. Abdomen polline confertiore albido aspersum, obscure cinerascens, nigro-pilosum. Hypopygium nigrum, nigro-pilosum, filamento centrali coneolore, tenui, flexuoso. Pedes simplices, pilis setisque tenuibus nigris vestiti. Halteres nigri. Alae hyalinae, costā venisque costae vicinis nigris, venis reliquis obscure fuscis, stigmate cinerascente, subobsoleto. — (New Hampshire; Osten-Sacken.)

59. *Rhamphomyia hirtipes* ♂. *Nigra opaca, antennis, proboscide mediocri, halteribus, hypopygio pedibusque concoloribus; alae hyalinae, venis tenuibus fuscis, stigmate subobsoleto; pili et setulae corporis nigrae, pili breviusculi in lateribus abdominis et ventre dilutissime lutescentes, pili longiusculi in hypopygio et in tibiis posticis (harum basalibus tamen exceptis) paulo saturatius luteoli.* — Long. corp.  $1\frac{1}{2}$  lin., Long. al.  $1\frac{1}{2}$  lin.

Minuta, nigra, opaca pilosula. Caput concolor, nigro-pilosum, oculis separatis. Antennae mediocres, nigrae; proboscis nigra, coxis anticis paulo longior; palpi nigri. Thorax nigro-pilosus, vittis tribus obscurioribus obsoletis, pleuris levissime albido-pollinosis. Abdomen opacum, pilis dorsalibus nigricantibus, lateralibus ventrali-

pilis dorsalibus nigricantibus, lateralibus ventralibusque dilutissime lutescentibus. Hypopygium concolor, subglobosum, pilis longinseculis luteolis instructum. filamento centrali obscuro, tenui, arcuato. Pedes toti nigri. pilis longioribus et confertioribus nigris vestiti; pili tibiarum posticarum reliquis longiores, prope tibiarum basim nigri, in tibiis reliquis sordide luteoli. Halteres nigri. Alae hyalinae. costâ venisque primis nigris, reliquis ex nigro fuscis, stigmate cinereo, subobsoleto. — (New Hampshire; Osten Sacken).

60. *Rhamphomyia irregularis* nov. sp. ♀. *Albo-pollinosa, thorace obsolete bivittato, abdomine candido micante, pedibus totis nigris, alis albidis, cellulâ discoidali maximâ.* — Long. corp.  $1\frac{7}{12}$  lin., Long. al.  $1\frac{2}{3}$  lin.

Nigricans, confertim albo-pollinosa, nudiuscula. Caput concolor, antennis brevibus nigris. Proboscis nigra, coxis anticis paulo longior. Thoracis dorsum obsolete cinereo bivittatum, pilis setulisque rarissimis nigris. Scutellum concolor. Abdomen candido-micans, praeter basim albido-pilosam subnudum, extremo apice cum stylis analibus nigro. Pedes cum coxis nigri, brevissime nigro-pilosuli. Halteres albi. Alae albidae, venis validiusculis dilutissime flavicantibus, apicem versus paulo obscurioribus, costâ et venae primae apice atris, stigmate subobsoleto; cellula discoidalis elongata, permagna; cellulae posteriores secunda et terlia parvae. — (New Hampshire; Osten-Sacken).

*Nota.* Rhamphomyiam irregulararem leucopterae uxorem esse crederem, nisi pili omnes multo breviores, pili abdominis omnes albidi alarumque venae crassiores essent.

61. *Rhamphomyia candicans* nov. sp. ♀. *Ex cinereo albicans, antennis nigris. proboscide brevi, coxis pedibusque flavis, tibiis anterioribus adversus apicem, posticis praeter basim tarsisque omnibus ex fusco nigris; alae exalbidae. stigmate obsoleto.* — Long. corp. 2 lin., Long. al.  $1\frac{1}{2}$  lin.

Ex cinereo albicans. opaca, nudiuscula. Caput concolor, antennis mediocribus nigris. Proboscis nigra, coxis anticis longior, femoribus brevior. Thorax non vittatus. pilis setulisque minutissimis, nigris. Scutellum concolor. Abdomen albido-pilosum, adversus apicem subnudum. Coxae flavicantes, posticarum basi cinereâ. Pedes flavicantes, nigro-pilosuli setulisque nigris rare aspersi, tibiarum anteriorum apice infuscato, tibiis posticis tarsisque omnibus ex fusco nigris. Halteres albidi. Alae albidae, venis concoloribus.

ribus, costâ et venae primæ apice nigris, stigmate obsoleto. — (New Hampshire; Osten-Sacken).

62. *Hilara tristis* nov. sp. ♂ et ♀. *Nigra, opaca, nigro-pilosa, halteribus pedibusque concoloribus, genibus testaceis, alis nigricantibus, metatarso antico maris modice incrassato.* — Long. corp. 2 lin.. Long. al.  $2\frac{1}{2}$  lin.

Tota nigra, nigro-pilosa, opaca, antennis, capite, hypopygio, halteribus pedibusque concoloribus, halterum pedunculo genibusque testaceis. Frons tota velutina. Thoracis dorsum polline rarissimo, dilute cinereo aspersum, vittis tribus obscurioribus subboletis. Pedes graciles, pilis brevibus setisque raris nigris vestiti, metatarso maris antico modice incrassato, oblongo, praeter pilos ordinarios supra setulas tres vel quatuor gerente. Alae nigricantes, stigmate nigro. — (New Hampshire; Osten-Sacken).

63. *Hilara seriata* nov. sp. ♂. *Cinerea, nigro-pilosa, ab domine nigro, antennis nigris, palpis, halteribus, coxis pedibusque testaceis, tibiis anticis adversus apicem, reliquis praeter basim fuscis, tarsis ex fusco nigris; primus tarsorum anticum articulus incrassatus; tibiae intermediae pilis longioribus erectis hirtae; alae cinereae, stigmate subnigricante.* — Long. corp.  $1\frac{1}{4}$  lin., Long. al.  $1\frac{3}{4}$  lin.

Frons atra, vittulâ ab antennis ascende[n]te nigrâ. Antennæ nigrae; palpi testacei. Thorax cinereus, opacus, vittis nullis, pilis setulisque nigris in series regulares dispositis. Scutellum concolor. Abdomen nigrum, modice nitens, nigro-pilosum. Pedes cum coxis testacei, tibiis anticis adversus apicem, posterioribus praeter basim fuscis, tarsis omnibus ex fusco nigris; metatarsus anticus incrassatus, ovatus; tibiae intermediae pilis erectis et paulo longioribus hirtae. Halteres testacei. Alae cinereæ, stigmate ex cinereo subnigricante. — (New Hampshire; Osten-Sacken).

Nota. Simillima *Hilarae* gracili, sed pili thoracis in series regulares dispositi tibiarnaque intermediarum hirsuties differentiam demonstrant.

64. *Hilara testacea* nov. sp. ♂. *Obscure lutea, opaca, capite, abdominis fasciis, hypopygio et tarsis nigricantibus. breviter et rare nigro-pilosa. tibiis intermediis tamen infra pilos longiores gerentibus; metatarsus anticus incrassatus; alae cinereae, adversus costam lutescentes. stigmate subfusco.* — Long. corp.  $1\frac{1}{3}$ — $1\frac{5}{6}$  lin.. Long. al. 2 lin.

Obscure lutea, opaca, pilis nigris brevioribus rarioribusque vestita. Caput nigrum, polline albido cinerascens. Antennarum articuli basales ex fusco lutei, tertius cum stylo niger. Palpi lutei. Abdomen fasciis basalibus segmentorum singulorum nigricantibus, in segmentis primis plerumque obsoletis, cingulatum. Pedes reliquo corpore paulo dilutiores, tarsis totis fuscis, tibiarum posticarum apice interdum infuscato; metatarsus anticus incrassatus; tibiae intermediae infra pilis longis instructae. Halteres lutescentes. Alae cinereae, adversus costam lutescentes, stigmate subfuscō. — (New Hampshire; Osten-Sacken).

Nota. Cavendum ne cum Hilarā luteā commisceatur, quae alas minus cinereas tibiasque intermedias infra breviter pilosas habet.

65. *Hormopeza brevicornis* nov. sp. ♂ et ♀. *Obscura*, *tarsorum anticum articulis oblongis*, *longitudine decrescentibus*, *tertio antennarum articulo globoso*, *alis exalbidis*, *stigmate nullo*. — Long. corp.  $1\frac{2}{3}$ — $1\frac{3}{4}$  lin., Long. al.  $1\frac{5}{6}$  lin.

Caput nigrum, oculis maris contiguis. Frons supra antennas nitida. Antennae brevissimae; articuli primi duo breves, flavi-cantes; articulus tertius globosus, niger; stylus terminalis brevis, niger, articulo basali crasso, apicali tenui. Proboscis brevissima, crassa, obtusa, nigro-fusca; palpi minuti, recurvi, sordide albicantes. Thorax niger, cinereo-pollinosus, opacus, pilis pallidis vestitus. Scutellum concolor. Abdomen nigrum, nitidum, pallide pilosum, hypopygio concolore. Pedes fusti, coxarum apice, imâ femorum basi genibusque plerumque luteis. Halterum capitulum subfuscum. Alae exalbidae, venis pallidis, stigmate nullo. — (Yukon River; Kennicot).

66. *Hormopeza nigricans* nov. sp. ♂. *Nigra*, *tarsorum anticum articulis oblongis*, *longitudine decrescentibus*, *tertio antennarum articulo ovali*, *alis cinereo-hyalinis*, *stigmate fuscō*. — Long. corp.  $2\frac{1}{2}$  lin., Long. al.  $2\frac{1}{2}$  lin.

Tota nigra, pallide pilosa. Caput concolor, oculis contiguis. Antennae breves, nigrae, articulo tertio ovali, styli brevis articulo basali crasso, apicali tenui. Proboscis brevissima, crassa, obtusa, ex fusco nigra; palpi minuti, recurvi, sordide albidi. Thorax cinereo-pollinosus, opacus. Scutellum concolor. Abdomen nigrum, nitidum, hypopygio concolore. Pedes nigri, coxarum apice genibusque extremis luteis. Halterum capitulum ex fusco nigrum. Alae cinereo-hyalinae, stigmate venisque fuscis. — (Yukon River; Kennicot).

Nota. Hormopezæ brevicornis et nigricans ab Hormopezâ obliteratâ distinguuntur tarsorum anticorum structurâ, quos Zetterstedtius in Hormopezâ obliteratâ moniliformes esse affirmat, quum illæ articulos eorum oblongos habeant. Ceteras notas, quas Zetterstedtius generi Hormopezæ tribnit, iis esse constat, unde dubitatio nulla, quin in hoc genere ponendæ sint.

67. *Gloma rufa* nov. sp. ♀. *Flava, supra rufescens, capite cinereo, antennarum articulo terminali et setâ nigris, tarsis apicem versus fuscis.* — Long. corp.  $2\frac{1}{2}$  lin., Long. al. 3 lin.

Flava, supra rufescens, nigro-pilosa. Caput nigrum, polline albo cinereum, facie fere totâ, proboscide palpisque flavis. Primi duo antennarum articuli breviusculi, flavi, nigro-pilosæ; articulus tertius niger, ovatus, apice subacuto, setâ crassiusculâ concolore. Tarsi apicem versus fuscæ. Alae ex cinereo lutescentes, stigmate paulo saturatius tinctorio, venis ex fusco luteis, adversus basim et costam luteis. — (New Hampshire; Osten-Sacken).

68. *Gloma obscura* nov. sp. ♂. *Nigra, halteribus, abdominis basi pedibusque ex testaceo flavis, ultimis duobus tarsorum articulis nigris.* — Long. corp.  $2\frac{5}{8}$  lin., Long. al.  $2\frac{1}{2}$  lin.

Nigra, nigro-pilosa. Caput concolor, proboscide fuscâ, palpis nigricantibus. Antennæ nigrae, articulis primis duobus breviusculis, nigro-pilosæ, tertio breviter ovato, setâ crassiusculâ concolore. Abdomen nitidum, nigrum vel fusco-nigrum, basi utrinque ex testaceo flava, subpellucidâ. Coxæ et pedes flavicantes, femoribus tibiisque posticorum apicem versus infuscatis, ultimis duobus tarsorum articulis nigris. Halteres flavescentes. Alae ex cinereo subfuscæ, stigmate paulo obscuriore, venis fuscis. — (New Hampshire; Osten-Sacken).

69. *Cyrtoma femorata* nov. sp. ♀. *Atra, thorace cinereo-pollinoso, tibiis posticis luteis, apicem versus atris, tertio antennarum articulo lanceolato, femoribus posticis incrassatis.* — Long. corp.  $1\frac{1}{2}\frac{1}{2}$  lin., Long. al. 2 lin.

Atra, antennis concoloribus, articulo tertio lanceolato. Thorax cinereo-pollinosus, subopacus; scutellum concolor. Pili thoracis et scutelli rari, nigri. Abdomen nitidum, pilis rarioribus albidis aspersum, segmentis singulis in dimidio anteriore obsolete cinereo-pollinosum. Pedes longi, atri, nigro-pilosæ, extremo coxarum apice genibusque extremis testaceis; femora postica incrassata; tibiae anticae validi-

usculae, prope basim crassiores; tibiae posticae crassae, oblique truncatae, luteae, apicem versus nigrae. Halteres sordide albicantes. Alae ex fusco cinereac, venis fuscis, stigmate obsoletiore subfusco. — (New Hampshire; Osten Sacken).

Nota. Nomen generis apud Graecos nentrum est, sed ab usu, qui adhuc obtinuit apud dipterologos, nunc quidem cedere nolui.

70. *Cyrtoma procera* nov. sp. ♀. *Atra, thorace cinereo-pollinoso, tibiis posticis luteis, apicem versus atris, tertio antennarum articulo lanceolato, femoribus posticis incrassatis.* — Long. corp.  $2\frac{1}{6}$  lin., Long. al.  $2\frac{1}{4}$  lin.

*Atra*, antennis concoloribus, articuli tertii dimidio basali latiusculo et ovato, apicali tenui et subulato. Thorax leviter cinereo-pollinosus; scutellum concolor. Pili thoracis et scutelli nigri. Abdomen nitidum, pilis albidis aspersum. Pedes longi, atri, nigropilosus, coxarum apice genibusque luteis; femora postica iucrassata; tibiae anticae validiusculae, basim versus vix crassiores; tibiae posticae crassae, oblique truncatae, luteae, apicem versus nigrae. Halteres sordide albicantes. Alae ex fusco cinereae, venis fuscis, stigmate obsoletiore subfusco. — (Sitka; Kolenati).

Nota. Speciei praecedenti similis, sed major antennarumque figurâ diversa.

71. *Tachypeza rapax* nov. sp. ♂. *Nigra; alae subfuscæ, in basi albae, venulâ transversâ basali posteriore instructæ; femora antica nigro-maculata, infra pilis pallidis ciliata, tibiae intermediae infra prope apicem breviter excisæ.* — Long. corp.  $1\frac{5}{6}$  lin., Long. al.  $1\frac{5}{2}$  lin.

Simillima Tachypezæ truncorum. Caput nigrum, subcinerascens; antennæ flavæ, articulo tertio saepe fusco; palpi albi; proboscis nigra. Thorax niger, dorso et scutello subopacus, pleuris nitidis. Abdomen plerumque ex fusco nigrum, in speciminiibus immaturis adversus basim sordide lutescens. Venter concolor, margine postico segmenti ultimi pilis longiusculis nigris ciliato. Hypopygium nigrum nitidum, supra pilis brevissimis hirtum. Coxæ flavæ, anticae prope apicem maculâ rotundâ nigrâ notatae. Trochanteres antici flavi, infra nigri. Femora antica crassissima, flava, in latere posteriore prope apicem puncto et atomo, in latero anteriore maculâ triangulâ basali, lineolis subtribus intermediis per puncta conjunctis et punto subapicali, omnibus nigris variegata. infra pilis pal-

lidis, tenuibus et longiusculis ciliata. Femora intermedia crassa. flava. Femora postica fusca vel nigro-fusca, basi flavâ, latere supero ex flavo testaceo. Tibiae anticae crassae, fuscae. sed latere supero toto et infero praeter apicem dilutissime flavicantibus. Tibiae intermediae fuscae vel subfuscæ, supra et infra praeter apicem dilute flavicantes, ante apicem infra leviter excisæ. Tibiae posticae dilute flavicantes, triente apicali nigro. Tarsi antici dilute flavicantes, articulo primo infra fusco, nltimis duobus nigris. Tarsi intermedii pallide flavicantes, articulis ultimis duobus nigro-fuscis. Tarsi postici ex nigro fuscæ-articulis primis duobus praeter apicem nigrantem exalbidis. Alae infuscatae, basi albidâ et venulâ transversâ basali posteriore manifestâ; cellula posterior prima submarginali paulo latior; venæ longitudinales tertia et quarta subparallelæ, quartæ apice tamen paulo recurvo. — (Illinois, Le Baron).

**Nota.** Foeminam possideo in marium supra descriptorum societate captam, quae coxas anticas immaeulatas, femora antica tota flavicantia utrinque atomo subapicali nigro notata, femora intermedia minus crassa et fuscum posticorum colorem minus extensem habet quam mas, quocum in reliquis notis congruit.

**72. *Tachypeza rostrata* nov. sp. ♂. *Nigra, proboscide pedibusque flavis, femoribus posticis tibiisque omnibus ex parte flavis, harum intermediis infra prope apicem leviter excisis; alae subfuscæ, in basi albae, venulâ basali posteriore instructæ.* — Long. corp.  $1\frac{1}{2}$  lin., Long. al.  $1\frac{5}{2}$  lin.**

Caput nigrum; antennæ flavicantes, articulo tertio subfusco; palpi albi; proboscis flava, extremo apice nigro. Thoracis dorsum et scutellum nigra, subopaca; pleurae nigrae, nitidae. Abdomen ex fusco nigrum, basi dilutiore, hypopygio nigro, nitido, pilis longioribus non instructo. Pedes cum coxis flavi. Femora antica valde incrassata; intermedia crassa; postica tenuia et praeter apicem et basim fusca. Tibiae anticae modice crassae, supra et infra flavicantes, utrinque subfuscæ; tibiae intermediae utrinque fuscae, supra flavicantes, infra subfuscæ vel flavicantes et prope apicem levissime excisæ; tibiae posticae basi tantum extremitâ exceptâ fusco-nigrae. Tarsi dilute flavicantes, adversus apicem ex fusco nigri. Alae praeter basim albidam infuscatae, venulâ transversâ basali posteriore manifestâ sed brevi, venis longitudinalibus tertiat et quartâ subparallelis, quartæ apice tamen leviter recurvo. — (New Hampshire).

**73. *Tachypeza clavipes* nov. sp. ♂. *Atra, nitida, pedibus concoloribus. tibiarum anticarum apice valde incrassato; alae***

*praeter basim albidi nigricantes, venulâ transversâ basali posteriore instructae.* — Long. corp.  $1\frac{1}{3}$  lin., Long. al.  $1\frac{1}{3}$  lin.

Caput nigrum; antennae nigro-fuscae; proboscis nigra; palpi albi. Thorax ater, nitidus, linea dorsi mediâ cinereo-pollinosâ. Abdomen fusco-nigrum, hypopygio atro, supra pilis brevibus nigris hirto. Coxae atrae, extremo apice piceo, anticae albo-pollinosae. Pedes atri, nitidi, tibiis anticis supra piceis tarsorumque posteriorum basi testaceâ. Femora antica modice incrassata, infra pilis longinseculis albis ciliata; tibiarum anticarum apex valde incrassatus. Femora intermedia posticis paulo crassiora, infra prope basim setulis aliquot nigris praedita; tibiae intermediae simplices. Halteres albi. Alae venulâ transversâ basali posteriore instructae, praeter basim albidi nigricantes, liturâ obsoletâ cinerascente inde a basi usque in cellulam posteriorem secundam pertinente; venae longitudinales tertia et quarta subparallelae, apice quartae obsolete recurvo. — (Illinois; Le Baron).

Nota. Foeminae duae, unâ cum mare descripto captae, eandem alarum picturam eundemque venarum cursum ostendunt, sed antenuis praeter apicem infuscatum flavis, thoracis dorso toto polline cinereo leviter asperso et minus nitido, coxis omnibus dilute flavicantibus, femoribus anterioribus infra et antice flavis, tibiis anterioribus fuscis supra flavicantibus, tibiis posticis praeter apicem nigrum et basim subfuscâm flavicantibus, et tarsis anterioribus praeter apicem pallidis discrepant. — Incertum est, utrum eadem alarum pictura eademque venarum configuratio has foeminas cum mare congregari jubeant, an valeat notarum reliquarum diversitas.

74. *Tachypeza pusilla* nov. sp. ♀. *Nitula, atra, proboscide palpisque concoloribus, pleurarum maculâ albicante nullâ, pedibus luteo et nigro variis; alae cinereae, dimilio costali inde a venae tertiae origine usque ad apicem infuscato. venulâ transversâ basali posteriore nullâ.* — Long. corp.  $1\frac{1}{2}$  — 1 lin., Long. al.  $\frac{5}{6}$  lin.

Minuta, atra, nitida. Caput atrum, proboscide et palpis concoloribus. Primi duo antennarum articuli fusi; articulus tertius in speciminibus descriptis deest. Thorax totus ater, nitidus, scutello concolore, pleuris immaculatis. Abdomen latiusculum, atrum, nitidum. Coxae luteae. Pedes antici lutei, femoribus tibiisque supra, tarsis totis nigro-fuscis. Pedes intermedii cum anticis concolores, tibiis totis tamen fusco-nigris, femoribus infra nigro-setulosis. Pedes postici praeter luteam femorum basim fusco-nigri, innâ tarsorum

basi rarins luteâ. Halteres albidi. Alae latiusculae, subcinerascentes, dimidio costali inde a venae tertiae basi usque ad apicem infuscato, venis longitudinalibus tertiatâ et quartâ parallelis, venula transversâ basali posteriore nullâ. — (Illinois; Le Baron).

Nota. Variat femoribus anticis supra minus infuscatis.

75. *Platypalpus aequalis* nov. sp. ♂ et ♀. *Niger, nitidus, thoracis dorso polline cinereo, pleuris praeter plagam inferam polline albido opacis, pedibus flavis, singulis tarsorum articulis in apice nigris; antennae nigrae, articulo tertio lanceolato; palpi testacei; cellulae alarum basales primu et secunda aequales; vena longitudinalis sexta basim versus abbreviata.* — Long. corp.  $1\frac{1}{4}$  lin., Long. al.  $1\frac{5}{6}$  lin.

Caput cinereum, fronte et facie albidioribus. Antennae nigrae vel fusco-nigrae, articulo tertio lanceolato. Palpi testacei, vel subfuscui; proboscis nigra. Thoracis dorsum et scutellum polline cinereo opaca. Pleurae praeter plagam nigram inferam, inter coxas anticas et intermedias sitam, polline ex cinereo albido aspersae. Abdomen nigrum, nitidum, ventre maris plerumque toto concolore, foeminae luteo, apicem versus nigro; hypopygium nigrum nitidum. Pedes cum coxis flavi, articulis singulis tarsorum in apice nigris, articulo ultimo toto nigro; femora antica valde incrassata, intermedia anticis crassiora, infra praepter pilos longiores flavicantes setulis nigris ciliata; dens apicalis tibiarum intermediarum magnus. Alae ex cinereo sublutescentes, venis lateis, apicem versus paulo obscurioribus, longitudinali tertiatâ apicem versus vix levissime incurvâ, quartae subparallelâ; cellulae basales prima et secunda aequales; venula transversa basalis posterior integra, sed adversus finem posteriorem tenuior; vena longitudinalis sexta adversus basim abbreviata. — (Illinois; Le Baron).

76. *Platypalpus trivialis* nov. sp. ♀. *Niger, nitidus, thoracis dorso polline cinereo, pleuris praeter plagam inferam polline albido opacis, pedibus flavis, singulis tarsorum articulis in apice nigris; antennae nigrae, articulo tertio breviter ovato; palpi flavi; alarum cellula basalis prima brevior quam secunda; vena longitudinalis sexta basim versus non abbreviata.* — Long. corp.  $1\frac{1}{4}$  lin., Long. al. 2 lin.

Caput ciuereum, facie confertim albo-pollinosâ. Antennae nigrae, articulo tertio breviter ovato. Palpi flavi; proboscis nigra. Thoracis dorsum et scutellum polline cinereo opaca. Pleurae praet-

ter plagam uigram nitidam, inter coxas anticas et intermedias sitam, polline albido aspersae. Abdomen nigrum, nitidum, ventre concolor. Pedes cum coxis flavi, articulis singulis tarsorum in apice nigris; femora antica modice, intermedia valde incrassata et infra praeter pilos longiores flavicantes setulis nigris ciliata; dens apicalis tibiarum intermediarum magnus. Alae cinereo-hyalinae, venis validis subfuscis, basim versus ex fusco lutescentibus, longitudinali tertia apicem versus incurvâ et cum quartâ convergente; cellularum basarium prima brevior quam secunda; venula transversa basalis posterior recta, integra et vena longitudinalis sexta basim versus non abbreviata. — (Maine, District Columbia; Osten-Sacken).

77. *Platypalpus pachycnemus* nov. sp. ♂. *Niger, nitidus, thoracis dorso et scutello polline cinereo opacis; antennae fuscæ, articulo tertio breviter ovato; pedes fusco et testaceo varii, tibiis anticis incrassatis; alae cinereæ, venâ longitudinali tertia incurvâ, cellulâ basali primâ longiore quam secunda.* — Long. corp.  $1\frac{1}{6}$  lin., Long. al.  $1\frac{3}{4}$  lin.

Caput ex nigro cinereum, facie confertim albo-pollinosâ. Antennæ saturate fuscæ, articulo tertio breviter ovato. Proboscis nigra; palpi fusi, albicantes. Thoracis dorsum polline cinereo leviter aspersum, subopacum, pallido-pilosulum. Scutellum concolor. Pleurae praeter plagam nitidam inferam albido-pollinosæ. Abdomen totum nigrum, nitidum, ventre et hypopygio concoloribus. Coxæ dilute testaceæ, basim versus fuscæ. Femora nigro-fusca, apice omnium posticorumque latere supero dilute testaceis; femora antica leviter, intermedia valde incrassata. Tibiae anticae incrassatae, fuscæ, in basi et infra dilute testaceæ; intermediae totæ fuscæ, dente apicali magno; posticae ex testaceo flavescentes, extremo apice infuscato. Primus tarsorum anticum articulus nigro-fusca, reliqui testacei, apice singulorum fusco; tarsi intermedii toti nigro-fusci; postici dilute testacei, articulis primis duobus in apice, sequentibus fere totis vel totis fuscis. Alae cinereæ, venis validis fuscis, in basi alarum lutescentibus, longitudinali tertia adversus finem incurvâ et cum quartâ convergente, cellulâ basali primâ quam secunda breviore; venula transversa basalis posterior completa; venæ longitudinalis sextæ segmentum primum subobsoletum. — (District Columbia; Osten-Sacken).

78. *Platypalpus lateralis* nov. sp. ♂ et ♀. *Ater, nitidus, thoracis marginibus lateralibus pleurisque albo-pollinosis, pedibus*

*flavis, ultimis tarsorum articulis in apice nigris; alae hyalinae, cellularum basarium primâ et secundâ acqualibus.* — Long. corp.  $1\frac{1}{4}$  lin., Long. al.  $1\frac{3}{4}$  lin.

Ater, nitidus. Caput ex nigro cinereum, subopacum. Antennae nigrae, articulo tertio breviter lanceolato, in basi flavo. Proboscis atra; palpi albi. Margines thoracis laterales et pleurae praeter maculam inferam nitidam polline conferto albido opaceae. Scutellum polline albido rariore aspersum. Abdomen atrum, nitidum, segmentis ultimis in foemina valde elongatis et minus attenuatis quam in *Platypalpis* plerisque. Pedes cum coxis flavi, primis tarsorum articulis in apice subfuscis, sequentibus fuscis, ultimo fere toto nigro; femora antica subincrassata, intermedia crassa, infra setulis nigris rarioibus ciliata; dens apicalis tibiarum intermediarum parvus. Alae hyalinae, venis fuscis, adversus basim alarum lutescentibus, longitudinalibus tertiatâ et quartâ apicem versus parallelis vel subparallelis; cellulae basales prima et secunda aequales; venula transversa basalis posterior subintegra, postice tenuior; vena longitudinalis sexta adversus basim non abbreviata. — (New Hampshire; Osten-Sacken).

79. *Platypalpus apicalis* nov. sp. ♀. Ater, nitidus, thoracis marginibus lateralibus pleurisque obsoletissime albido-pollinosis, pedibus flavis, femorum anticorum posticorumque apice supra maculâ oblongâ nigrâ notatis, ultimo tarsorum articulo nigro; alae hyalinae; cellulae basales prima et secunda aequales. — Long. corp.  $1\frac{1}{2}$  lin., Long. al.  $1\frac{2}{3}$  lin.

Ater, nitidus. Caput minus nitens, facie confertim albo-pollinosâ. Antennae nigrae, articulo tertio breviter ovato, basi anguste luteâ. Proboscis nigra; palpi albidi. Thoracis margines laterales et pleurae polline albido-cinereo obsoletissime aspersae, modice nitentes. Abdomen nitidum. Pedes cum coxis flavi, ultimo tarsorum articulo nigro, femoribus anticis posticisque in apice supra maculâ ovatâ nigrâ notatis; femora antica modice incrassata, intermedia anticis paulo crassiora, infra breviter nigro-ciliata; dens apicalis tibiarum intermediarum brevis. Alae hyalinae, venis fuscis, in basi luteis, longitudinalibus tertiatâ et quartâ parallelis; cellulae basalis prima secundae aequalis vel paulo longior; venula transversa basalis posterior completa; vena longitudinalis sexta basim versus abbreviata. — (Pennsylvania; Osten-Sacken).

80. *Platypalpus flavirostris* nov. sp. ♂. Flavus, supra rufescens, nitens, capite cinereo, proboscide flavâ, ultimo antennâ

*rum articulo nigro, ultimo tarsorum articulo praeter basim fusco, dente apicali tibiarum intermedianum parvo.* — Long. corp.  $1\frac{1}{3}$  lin., Long. al.  $2\frac{1}{2}$  lin.

Flavus, supra rufescens, nitens, breviter flavo-pilosulus. Caput cinereum, facie albido-cinereum. Primi duo antennarum articuli flavi; articulus tertius parvus, breviter ovatus, niger, setâ concole. Palpi dilute flavicantes; proboscis longinscula, lutea, apice nigricante. Pleurae supra polline albo rarissimo leviter aspersae, infra maximâ ex parte nudae. Abdomen supra subfuscum, hypopygio nigro. Femora antica non incrassata, intermedia valde incrassata, infra setulis nigris ciliata; tibiarum intermedianum dens apicalis parvus; articulus ultimus tarsorum omnium praeter basim infuscatus. Alae sublutescentes, venis dilute luteis, longitudinali tertiatâ apicem versus levissime incurvâ et cum quartâ subconvergente. cellulis basalibus primâ et secundâ aequalibus, venulâ transversâ basali posteriore incurvâ et postice abbreviatâ, venae longitudinalis sextae basi non obsoletâ. — (New Hampshire; Osten-Sacken).

81. *Platypalpus laetus* nov. sp. ♀. *Flavus, nitens. capite cinereo, proboscide nigra, articulo ultimo antennarum et tarsorum nigricante, dente apicali tibiarum intermedianum majusculo.* — Long. corp.  $1\frac{1}{2}$  lin., Long. al.  $1\frac{2}{3}$  lin.

Flavus, nitens, breviter flavo-pilosulus. Caput cinereum, fronte et facie confertim albo-pollinosis. Primi duo antennarum articuli flavi; articulus tertius parvus, breviter ovatus, fusco-niger, setâ nigra. Proboscis brevis, tota nigra; palpi albidi. Pleurae supra polline albo rarissimo leviter aspersae, infra maximâ ex parte nudae. Styli anales nigro-fusci. Femora antica modice incrassata, intermedia crassissima, infra setulis nigris ciliata; tibiarum intermedianum dens apicalis majusculus; articulus ultimus tarsorum omnium nigricans. Alae sublutescentes, venis luteis, longitudinali tertiatâ rectâ, quartâ leviter recurvâ et apicem versus cum tertiatâ subconvergente, cellulâ basali primâ quam secunda paulo breviore, venulâ transversâ basali posteriore rectâ et integrâ, venae longitudinalis sextae basi obsoletâ. — (New Hampshire; Osten-Sacken).

82. *Dolichopus splendidulus* nov. sp. ♂. *Aeneo-viridis, pedibus flavis. coxis anticis tibiisque posticis totis concoloribus, tarsis posticis unicoloribus totis nigris, ciliis oculorum inferioribus tegularumque ciliis flavicantibus; femora postica pilis flavicantibus*

*ciliata; ultimus tarsorum anticorum articulus dilatatus, ater.* — Long. corp.  $2\frac{1}{2}$  lin., Long. al.  $2\frac{5}{12}$  lin.

Aeneo - viridis, nitens. Facies ex aureo ochracea. Antennae totae nigrae, medioeres, artienlo tertio brevi. Lamellae hypopygii albae, nigro-limbatae. Coxae anticae nigro-pilosulac; femora postica prope apicem setâ solitariâ instrneta, infra pilis flavicantibus rare ciliata; tibiae posticae simplices; tarsorum anticorum artienli primi quatuor tenues, longitudine decrescentes, flavi, subalbicans, articulus terminalis compressus, modice dilatatus, ater. Alae cinereo-hyalinae, costâ ad exitum venae longitudinalis primae breviter in-crassatâ, venâ longitudinali quartâ nou fractâ. — (New Hampshire; Osten-Sacken).

Nota. A Dolichopus splendido, quem magnitudine non aequat, differt: tertio antennarum articulo breviore. ultimo tarsorum anticorum articulo paulo minore ciliisque femorum posticorum multo rarioribus.

83. *Dolichopus quadrilamellatus* ♂ et ♀. *Aeneo-viridis, antennis brevibus nigris, articulo primo tamen infra flavo, ciliis oculorum inferioribus albis, tegularum ciliis nigris, coxis anticis pedibusque pallide flavis, tarsis posterioribus inde ab articuli primi apice nigris, alis cinereo hyalinis, venâ longitudinali quartâ non fractâ.*

♂. *tarsorum anticorum articulis decrescentibus, primis tribus tenuibus et dilute flavis, duobus ultimis depresso, modice dilatatis et atris.*

♀. *tarsis anticis simplicibus, inde ab articuli primi apice nigris.*

Long. corp.  $3-3\frac{1}{2}$  lin., Long. al.  $2\frac{11}{12}-3$  lin.

Laete aeneo-viridis, nitens. Facies alba, in mare latiuscula, in foeminâ lata. Antennae breves, atrae, articulo primo praeter marginem superum flavo. Lamellae hypopygii luteae, lobatae et reducatae, ita ut duplices esse videantur, lobi secundi margine adusto, setulis aliquot incurvis nigris pilisque subtilibus albidis vestito. Coxae anticae flavae, nigro-pilosulac; femora postica prope apicem setam solitariam gerentia; tibiae posticae in utroque sexu simplices. — (New York. Osten-Sacken).

84. *Dolichopus paluesticus* nov. sp. ♂. *Aeneo-viridis, pedibus flavis, coxis anticis tibiisque posticis totis concoloribus, antennis tarsisque posticis totis nigris, ciliis oculorum inferioribus*

*tegularumque ciliis flavicantibus, maris ultimo tarsorum anticorum articulo valde dilatato.* — Long. corp.  $2\frac{5}{6}$  lin., Long. al.  $2\frac{3}{4}$  lin.

Facies maris angusta, ex aureo ochracea, foeminae lata, dilutius oehracea. Coxae anticae totae flavae, nigro-pilosulae; coxae posteriores cinereae. Lamellae hypopygii albae. limbo marginali latiusculo, nigro. Pedes flavi; femora postica prope apicem setâ solitariâ, infra ciliis flavicantibus instructa; tibiae posticae crassiusculae, in latere postico praeter trientem apicalem denudatae; tarsorum anticorum articuli primi quatuor flavi, longitudine decrecentes, articulus ultimus duobus praecedentibus simul sumptis longior, compressus et eximie dilatatus, ater, in latere posteriore candido-micans. Alae hyalinae, costâ ad venae primae exitum non-nihil inerassatâ, venâ longitudinali quartâ non fractâ. — (New Hampshire; Osten-Saeken).

Nota 1. A Dolichopo batillifero differt: ciliis femorum posteriorum rarioribus tibiis posticis minus incrassatis et in latere posteriore longius denudatis, tarsis denique posticis totis nigris.

Nota 2. Foeminam possideo, alis subinfuscatis instructam, quam legitimam Dolichopi palaestrici uxorem esse suspicor.

85. *Dolichopus dorycerus* nov. sp. ♂. *Viridi-aeneus, cupreo-micans, antennis praeter articulum primum nigris et setâ lamelliferâ instructis, ciliis oculorum tegularumque nigris, pedibus luteis, tarsis praeter basim nigris, ultimis quatuor anticorum articulis brevibus et valde dilatatis.* — Long. corp 3 lin., Long. al.  $2\frac{3}{4}$  lin.

Facies ex fusco ochracea. Antennae breves, artienlo primo flavo, secundo subobsoleto, tertio minuto nigro, setâ tenui, lamella ellipticam ferente. Lamellae hypopygii medioeres, sordide albidae. latius nigro-limbatae. Coxae anticae luteae, nigro-pilosae, posteriores nigrae. Pedes lutei; femora postica prope apicem setis binis armata; tibiae simplices, posticæ non incrassatae, in latere posteriore mæulis duabus ex nigro fuseis, alterâ subbasali, alterâ apicali notatae; primus tarsorum anticorum articulus praeter apicem luteus, reliquis simul sumptis longior, articuli sequentes perbreves, dilatati, atri; tarsi posteriores inde ab articuli primi apice nigri. Alae ex cinereo hyalinae, adversus costam sublutescentes, angulo postico bilobo, venâ longitudinali quartâ non fractâ et costâ ad venae primae exitum leviter inerassatâ. — (New Hampshire; Osten-Sacken).

86. *Dolichopus melanocerus* nov. sp. ♂ et ♀. *Viridis, antennis nigris, ciliis oculorum inferioribus albidis, tegularum ciliis*

*nigris, coxis anticis pedibusque flavis, tarsis anterioribus inde ab articuli primi apice, posticis totis tibiarumque posticarum apice nigris, renū longitudinali alarum quartū non fractā.*

♂. *facie ochraceā, femoribus posticis ciliatis.*

♀. *facie ex albo ochraceā, femoribus posticis non ciliatis.*

Long. corp.  $2\frac{7}{12}$  lin.. Long. al.  $2\frac{1}{2}$  lin.

Antennae totae nigrae, articulo tertio maris oblongo-ovato, foeminae breviore. Lamellae hypopygii albae, anguste nigro marginatae. Coxae anticae nigro-pilosae et in basi nigricantes, posteriores ex nigro cinereae. Femora maris postica infra pilis rarioribus flavidantibus ciliata; tibiae maris posticae in latere posteriore ex parte pilis destitutae. Alae cinereo-hyalinae, venā longitudinali quartā non fractā; mas costam prope venae primae exitum nodatam habet. — (Canada; Couper).

87. *Gymnopternus coxalis* nov. sp. ♂. *Aeneo-viridis, antennis totis nigris, lamellis hypopygii lunatis, flavicantibus, coxis nigris, unicorum dimidio apicali pedibusque flavis, tarsis inde ab articuli primi apice nigris, ultimo anticorum articulo non depresso.* — Long. corp.  $1\frac{1}{2}$  lin.. Long. al.  $1\frac{1}{2}$  lin.

Facies albida, interdum dilutissime flavescens vel ex albo cineraceens. Frons albido-pollinosa. Lamellae hypopygii flavescentes, lunatae, angulo supero acuto, ciliis brevibus nigris. Tegulae nigrociliatae. Ordinariae tibiarum anticarum setulae apicem versus brevissimae. Alae cinereae. — (New York, Osten-Sacken).

88. *Gymnopternus meniscus* nov. sp. ♂ et ♀. *Aeneo-viridis, antennis totis nigris, lamellis hypopygii lunatis, flavicantibus, coxis anticis pedibusque flavis, imā illarum basi nigrā, tarsis anticis apicem versus subfuscis, posterioribus inde ab articuli primi apice fuscis.* — Long. corp.  $1\frac{7}{12}$  lin., Long. al.  $1\frac{7}{12}$  lin.

A Gymnopterno coxali, cui simillimus, differt magnitudine, coxis anticis praeter imam basim flavis tarsisque dilutioribus. — (District Columbia; Osten-Sacken).

89. *Pelustoneurus abbreviatus* nov. sp. ♂ et ♀. *Obscure viridis, setā antennarum breviter plumatā, ciliis oculorum inferioribus nigris, pedibus ex testuceo flaris, femoribus anterioribus interdum basim versus infuscatis, coxis omnibus nigris, lamellis hypopygii brevissimis, nigris.* — Long. corp.  $1\frac{1}{2}$  lin., Long. al.  $5\frac{5}{12}$  lin.

Antennae rufae, apicem versus ex fusco nigræ, setā breviter plumatā. Facies maris albicans, foeminae obscure cinerea, supra et

adversus latera obsolete albicans. Thoracis dorsum polline subfuscō leviter aspersum, adversus marginem posticū minus opacum. Scutellum ex viridi chalybescens. Tegulae albidae, nigro-ciliatae. Lamellae hypopygii perbreves, sublunatae, nigrae. Coxae nigrae. Pedes flavi vel ex testaceo flavi, femorum posticorum apice nigro; tarsi posteriores praeter basim nigri, antici apicem versus fusci. Alae obscure cinereae, subnigricantes. — (New York, Osten-Sacken).

90. *Pelastoneurus lamellatus* nov. sp. ♂. *Obscure viridis, posticā thoracis parte et scutello violaceis, setā antennarum longe plumatā, ciliis oculorum inferioribus nigris, pedibus flavis, coxis anticis concoloribus, basim versus nigricantibus, lamellis hypopygii brevissimis nigris.* — Long. corp.  $1\frac{1}{2}$  lin., Long. al.  $1\frac{5}{12}$  lin.

Antennae rufae, apicem versus ex fuso nigrae, setā longe plumatā. Facies albo-micans. Thoracis dorsum polline subfuscō leviter aspersum, adversus marginem posticū obscure violaceum. Scutellum concolor. Tegulae albidae, nigro-ciliatae. Lamellae hypopygii perbreves, sublunatae, nigrae. Coxae anticae flavae, albo-micaentes, adversus basim late nigricantes. Pedes flavi, apice femorum posticorum nigro; tarsi posteriores praeter basim nigri, antici apicem versus fusci. Alae obscure cinereae, subnigricantes. — (New York, Osten-Sacken).

Nota. A Pelastoneuro abbreviato distinguitur: colore thoracis et scutelli, setā antennarum longius plamatā, coxis anticis magnā ex parte flavis et venis longitudinalibus alarum tertiarā et quartā intervallo latiore separatis.

91. *Pelastoneurus alternans* nov. sp. ♀. *Obscure viridis, vittis thoracis alternis aeneis et ex caeruleo viridibus, setā antennarum breviter pubescente, ciliis oculorum inferioribus albidis, coxis anticis pedibusque flaris.* — Long. corp.  $1\frac{7}{12}$  lin., Long. al.  $1\frac{1}{2}$  lin.

Antennae rufae, apicem versus nigrae, setā breviter pubescente. Facies quam in reliquis speciebus angustior, obscure cinerea. Tegulae albidae, nigro-ciliatae. Coxae anticae totae flavae, nigropilosae, vix obsoletissime albicantes. Tarsi inde ab articuli primi apice ex fuso nigri. Alae obscure cinereae, subnigricantes. — (New York, Osten-Sacken).

92. *Porphyrops longipes* nov. sp. ♂. *Viridis, facie albā, coxis ex viridi nigris, pedibus anterioribus flavis, articulis torso-rum ultimis duobus nigris, pedibus posticis nigris, femorum basi*

*tibiisque supra (basi tamen exceptā) testaceis, tibiarum apice tarsisque fuscis, exterioribus hypopygii appendicibus filiformibus, bipartitis.* — Long. corp.  $2\frac{1}{2}$  lin., Long. al.  $2\frac{5}{8}$  lin.

Obscurè viridis, nitens, lineis thoracis duobus obseuriōribus. Facies angusta, alba. Antennae nigrae, articulo tertio lanceolato. setā antennis paucis longiore. Occiput infra pilis confertis albis vesticum. Tegulae albido-ciliatae. Appendices exteriōres hypopygii testaceae, filiformes, bipartitae, pilis albidis subtiliter ciliatae. Coxae ex viridi nigrae, intermediae pilorum nigrorum fasciculo rigido armatae. Pedes antici dilute flavi, ultimis duobus tarsorum articulis nigris, primo reliquis simul sumptis fere longiore, in apice infra subdilatato. Pedes intermedii graciles dilute flavi, ultimis duobus tarsorum articulis nigris. Femora postica non incrassata, nigra, basi tamen testacea; tibiae posticae crassiunculae, nigrae, apicem versus fuscae et supra praeter basim dilute testaceae vel flavae; tarsi postici crassiunculi, fusi, articulis ultimis duobus nigris. Alae cinereo-hyalinae, venā longitudinali tertia apicem versus leniter recurvā, quartā leniter flexā. — (New Hampshire; Dsten-Sacken).

93. *Cordylura praeusta* nov. sp. ♂. *Dilute flavescens, fronte et dorso saturatiōribus, singulis abdominis segmentis anguste fusco marginatis, setā antennarum nigro-plumosā, alarum apice et venā transversā posteriore fusco-limbatis.* — Long. corp.  $3\frac{1}{2}$  lin., Long. al.  $2\frac{3}{4}$  lin.

Dilute flavescens, nitida, pilis plerisque et setis omnibus nigris. Caput concolor, fronte ochraccā, albo-pollinosā, opacā, facie praeter laiera exalbidā, setā mystacinā utrinque unā. Antennae flavantes, breviores, articulo tertio obtuso, setā nigrā et pilis nigris plumatā. Scutellum setis duabus longis pilisque duobus minutis nigris instructum. Abdomen supra nigro-pilosum, utrinque et infra pilis tenuibus pallidis vestitum, segmentis singulis postice subtiliter fusco marginatis. Pedes dilute flavescentes, pilis omnibus setisque rarissimis nigris. Alae ex cinereo sublutescentes, apice late, venā transversā posteriore angustae fusco-limbatis. — (Canada; Couper).

94. *Cordylura nana* nov. sp. ♀. *Atra, nitida, thoracis marginibus lateralibus et vittā mediā latissimā cinereo-pollinosis, capite praeter superius occipitis dimidium pedibusque flavis, setā antennarum nudā, alis odversus costam nigricantibus.* — Long. corp. 2 lin., Long. al.  $1\frac{3}{4}$  lin.

Caput flavum; antennae concolores, articulo tertio obtuso, setā

tenui subnudâ. Prohoscis cum palpis pallida. Superius occipitis dimidium nigrum; vertex concolor, maculâ geminâ polline albido aspersâ. Thorax ater, nitidus; dorsi vitta latissima polline cinereo opaca, margines laterales polline albido-cinereo aspersi; pleurae infra polline albido cinereae. Abdomen atrum, nitidum. ventre pallido. Pedes cum coxis lavi, extremis posticorum genibus nigris. Alae cinereo-hyalinae, adversus costam ex cinereo nigricantes. ita ut cellula marginalis inde a venae primae fine reliquâ alâ obscurior sit. — (Canada; Conper.)

95. *Tetanocera ambiguua* nov. sp. ♂. *Antennae elongatae, tenues, articulis ultimis duobus subaequalibus, setâ albo-plumosa: alae nigro-reticulatae, limbo costae et apicis nigro.* — Long. corp.  $2\frac{7}{12}$  lin., Long. al.  $2\frac{1}{4}$  lin.

Corporis forma ac figura omnino Tetanocerae, sed caput et antennae Spedontis, ita ut quasi intermedia inter utrumque genus appareat. Ex fusco testacea, thorace et abdome fusco punctulatis. Frons utrinque maculas binas nigras habet, quarum inferior juxta antennas sita est. Antennae longae, tenues, testaceae, apicem versus nigrae; articolus secundus tertio subaequalis, pilis rarioribus nigris instructus; articolus tertius obtusus; seta alba, basim versus lutea, albo-plumosa. Facies prope antennas tuberculum laevigatum badium habet. Pedes testacei, tibiis anticis praeter basim, reliquis in apice nigris. Alae breviuscule, nigro-reticulatae, guttulis marginalibus nullis ita ut limbus costae et apicis niger, marginis postici ex nigro cinereus sit; vena transversa posterior valde arcuata. — (Maine.)

96. *Sapromyzza decora* nov. sp. ♀. *Flavescens, maculis nigris variegata, alis fusco-reticulatis.* — Long. corp.  $2\frac{1}{6}$  lin., Long. al.  $2\frac{1}{4}$  lin.

Dilute flavescens, infra pallidior. Tertius antennarum articolus triangulus, supra leviter excisus, setâ nigro-plumâtâ. Frons praeter margines nigro-maculatos convexa, nitida, maculam geminam atram gerens. Genae et occiput fusco-maculata. Thorax et abdomen maculis nigris, seriatim dispositis ornata. Femora singula infra maculâ nigrâ notata. Alae fusco-reticulatae, costâ et apice radiatis, disco et margine postico guttatis. — (Lake George N. Y.; Osten-Sacken.)

Nota. Capitis forma et praecipue antennarum simillima quibusdam Tetanoceris; hoc et peculiaris frontis figura causam praebeat eximiâ, ut haec species pro typo habeatur unius eorum generum, in quaē Sapromyzae discepndae sunt.

97. *Heteroneura melanostoma* nov. sp. ♂. *Dilutissime flavescens, facie et abdomine nigris, setâ antennarum subnudâ, venis transversis alarum approximatis* — Long. corp.  $1\frac{5}{12}$  lin., Long. al.  $1\frac{7}{12}$  lin.

*Dilutissime flavescens, pedibus totis concoloribus. Facies nigra, opaca, supra dilute flavescens. Seta antennarum subnuda. Thoracis dorsum paulo saturatius flavescens, utrinque albo-marginatum. Plenae dilute flavescentes, supra obsoletius fusco-vittatae. Abdomen nigrum, nitidum. Alae hyalinae, plagâ apicali nigra; venae transversae approximatae ita ut anterior a cellulae discoidalis basi intervallo fere duplo latiore quam ab apice distet.* — (New Hampshire; Osten-Sacken.)

**Nota.** Ab *Heteroneurâ albimanâ*, cui propinquâ, pedibus anticus totis flavis facile distinguitur.

98. *Opomyza lurida* nov. sp. ♂ et ♀. *Lutea, metanoto pleurisque ex nigro fuscis, abdomine nigro, pedibus dilute luteis, femorum posticorum annulo subapicali obsoletissime subfuscâ;* ♂. *hypopygio nigro;* ♀. *abdominis apice luteo.* — Long. corp.  $1\frac{2}{3}$  —  $1\frac{3}{4}$  lin.. Long. al.  $1\frac{2}{3}$  lin.

*Lutea.* Caput concolor, occipite et superiore frontis dimidio fuscis, inferiore frontis dimidio et antennis ochraceis. Thoracis dorsum sordide luteum, adversus latera subfuscum; color scutelli ex Luteo in fuscum vergens; pleurae obscure fuscae; metanotum ex fuso nigrum; abdomen nigrum, hypopygio maris concoleore, summo apice in foeminâ luteo. Pedes dilute lutei, femoribus posticis ante apicem colore dilute subfuscâ obsolete annulatis, tibiis posticis praeter medianam partem saepe subfuscis. Alae subhyalinae, maculâ apicali angustisque vennularum transversalium limbis ex fuso nigris. — (Sitka; Sahlberg.)

**Nota.** Variat frontis dimidio superiore, occipite, metanoto pleurisque ex ferrugineo rufis.

99. *Ephydria subopaca* nov. sp. ♂ et ♀. *Viridi-aenea, polline fusco-cinereo subopaca, pedibus testaceis; peristomium soeminarum setis longis, maris brevioribus et rarioribus ciliatum; hypopygium oblongum, convexum, subtilissime carinatum.* — Long. corp.  $1\frac{1}{2}$  — 2 lin., Long. al.  $1\frac{7}{12}$  —  $1\frac{2}{3}$  lin.

*Viridi-aenea*, thoracis dorso et scutello interdum cupreis, polline ex fuso cinereo vel ex fuso ochraceo subopaca. Frons praeter margines laterales nitida. Antennae nigrae, pilo lateralî articuli tertii nullo, setâ breviter pectinatâ. Facies maris descripti polline con-

ferto ochraceo, foeminarum albo tecta. Latera peristomii foemina setis longis nigris, mas brevioribus et rarioribus ciliata habet. Hypopygium oblongum, convexum, carinulâ mediâ linearî. Coxae testaceae et cinerascentes, vel cinereae. Pedes testacei, tibiarum apice fusco, tarsis ex fusco nigris; femora interdum supra ex cinereo glanca; femora postica in latere posteriore vittam denudatam, nitidam, badiam vel fuscâ habent; tibiae posticae, supra setosulae, in triente apicali lineolâ laevigatâ, badiâ vel fuscâ notantur. Alae cinereae vel fusco-cinereae, venis fuscis. — (Connecticut; Osten-Sacken.)

Nota. Color pollinis faciei, quem in foeminis duabus album, in mare uno ochraceum observavi, variabilis esse videtur; alterum sexum faciem semper polline ochraceo, alterum albo aspersam habere, veri simile non est.

100. *Caenia spinosa* nov. sp. ♀. *Aeneo-viridis, pedibus fusco-testaceis, alarum nigricantim costâ nigro-setosâ, abdomine infra anum spinis duabus recurvis armato.* — Long. corp.  $2\frac{1}{4}$  lin., Long. al.  $2\frac{1}{4}$  lin.

*Aeneo-viridis.* Frons praeter latera et superius faciei dimidium nitida; dimidium faciei inferius ochraceo-pollinosum, pilis nigris vestitum, peristomio setis longis nigris ciliato. Thoracis dorsum et scutellum polline subfusco aspersa, subnitida. Pleurae supra polline ex ochraceo fusco, infra cinereo opacae. Singula abdominis segmenta in dimidio posteriore glaucescentia; infra anum spinae duae tenues, leviter recurvae conspicuntur. Coxae polline albido cinereae. Pedes fusco-testacei, apicem versus fusi. Alae nigricantes, costâ setis validiusculis nigris armatâ. — (Massachusetts; Sanborn)

---

Ad calcem hujus centuriae licet pauca a me errata emendare et tabulam secundum systematis ordinem dispositam earum specierum addere, quas quinque hae centuriae complectuntur.

Species, quam Empidis pietae nomine (Cent. III. 28.) descripsi, jam a Wiedemannio Empidis spilopterae nomine descripta est. — Nonnullis speciebus locus additus est „New Wisconsin“, qui „Northern Wisconsin“ esse debebat.

Catalogus generum et specierum, quae insunt in quinque  
primis dipterorum centuriis.

**Culicidae.**

*Corethra.*  
*trivittata* . . . . II. 1.

**Chironomidae.**

*Chasmatonotus.*  
*nnimaculatus* . . V. 1.

*Tanyphns.*  
*flavicinctus* . . I. 2.  
*pinguis* . . . . I. 1.  
*tricolor* . . . . I. 3.

*Ceratopogon.*  
*albiventris* . . I. 7.  
*argentatus* . . I. 5.  
*bimaculatus* . . I. 6.  
*festivus* . . . . I. 13.  
*longipennis* . . I. 10.  
*opacus* . . . . I. 9.  
*plebejus* . . . . I. 11.  
*rufus* . . . . I. 12.  
*setulosns* . . . . I. 8.  
*trivialis* . . . . I. 4.

**Blepharopteridae.**

*Blepharoptera.*  
*capitata* . . . . IV. 43.

**Tipulidae.**

*Dixa.*  
*centralis* . . III. 3.  
*fusca* . . . . III. 5.  
*marginata* . . III. 1.  
*notata* . . . . III. 4.  
*terna* . . . . III. 2.

*Holorusia.*  
*rubiginosa* . . IV. 1.

*Tipula.*  
*angulata* . . V. 22.  
*angustipennis*. IV. 19.  
*apicalis* . . . . IV. 2.  
*appendiculata*. IV. 20.  
*balloptera* . . IV. 15

<i>bella</i> . . . .	IV. 29.	<i>pedunculata</i> . . IV. 33.
<i>caloptera</i> . .	IV. 30.	<i>polymera</i> . . IV. 40.
<i>canadensis</i> . .	V. 19.	<i>punctum</i> . . IV. 34.
<i>easta</i> . . . .	IV. 25.	<i>sodalis</i> . . . . V. 29.
<i>centralis</i> . .	V. 21.	<i>suturalis</i> . . . . IV. 37.
<i>cincta</i> . . . .	IV. 24.	<i>tennis</i> . . . . IV. 41.
<i>discolor</i> . . . .	IV. 12.	<i>unifasciata</i> . . IV. 35.
<i>eluta</i> . . . .	IV. 27.	<i>unimaculata</i> . . V. 28.
<i>fallax</i> . . . .	IV. 10.	<i>virescens</i> . . . . V. 25.
<i>fasciata</i> . . . .	IV. 6.	<i>vittula</i> . . . . V. 27.
<i>fragilis</i> . . . .	IV. 7.	<i>xanthostigma</i> . . V. 31.
<i>fraterna</i> . . . .	V. 14.	<i>Stygeropis.</i>
<i>grata</i> . . . .	IV. 11.	<i>sordida</i> . . . . IV. 42.
<i>hebes</i> . . . .	IV. 18.	
<i>infuscata</i> . . . .	IV. 26.	
<i>ignobilis</i> . . . .	IV. 9.	
<i>latipennis</i> . . . .	V. 20.	
<i>longiventris</i> . .	IV. 5.	
<i>macrolabis</i> . . . .	V. 17.	
<i>pallida</i> . . . .	IV. 16.	
<i>pubera</i> . . . .	V. 16.	
<i>septentrionalis</i>	IV. 4.	
<i>serrulata</i> . . . .	V. 18.	
<i>serta</i> . . . .	IV. 14.	
<i>speciosa</i> . . . .	IV. 22.	
<i>strepens</i> . . . .	IV. 28.	
<i>subfasciata</i> . . . .	IV. 13.	
<i>submaculata</i> . . . .	IV. 23.	
<i>suspecta</i> . . . .	IV. 8.	
<i>tephrocephala</i> . .	V. 23.	
<i>ternaria</i> . . . .	V. 15.	
<i>tessellata</i> . . . .	IV. 3.	
<i>umbrosa</i> . . . .	IV. 31.	
<i>valida</i> . . . .	IV. 21.	
<i>versicolor</i> . . . .	IV. 17.	

**Pachyrrhina.**

<i>abbreviata</i> . .	IV. 36.
<i>circumscripta</i> . .	IV. 38.
<i>eucera</i> . . . .	IV. 39.
<i>gracilicornis</i> . .	V. 32.
<i>inecurva</i> . . . .	IV. 32.
<i>lugens</i> . . . .	V. 26.
<i>nobilis</i> . . . .	V. 24.
<i>occipitalis</i> . . . .	V. 30.

**Xylophagidae.**

*Rachicerus.*  
*obscuripennis*. III. 6.  
*varipes* . . . . III. 7.

*Xylophagus.*  
*lugens* . . . . III. 8.

<b>Subula.</b>	ravus . . . . IV. 50.	plumata . . . . IV. 68.
pallipes . . . . III. 9.	validus . . . . IV. 48.	tristis . . . . IV. 71.
<b>Arthropeas.</b>	<b>Systoechus.</b>	<b>Chrysogaster.</b>
americanus . . . . I. 16.	candidulus . . . . IV. 51.	latus . . . . IV. 59.
<b>Bolbomyia.</b>	vulgaris . . . . IV. 52.	nigripes . . . . IV. 60.
nana . . . . II. 5.	<b>Lordotus.</b>	<b>Orthoneura.</b>
<b>Stratiomyidae.</b>	gibbus . . . . IV. 53.	pictipennis . . . . IV. 58.
<b>Pachygaster.</b>	<b>Phthiria.</b>	modestus . . . . IV. 62.
pulcher . . . . III. 16.	notata . . . . III. 19.	pubescens . . . . IV. 61.
<b>Nemotelus.</b>	sulphurea . . . . III. 18.	<b>Paragus.</b>
aenirostris . . . . III. 13.	<b>Geron.</b>	angustifrons . . . . IV. 64.
canadensis . . . . III. 12.	calvus . . . . IV. 54.	dimidiatus . . . . IV. 63.
crassus . . . . III. 10.	subauratus . . . . IV. 55.	<b>Xylota.</b>
unicolor . . . . III. 11.	<b>Systropus.</b>	barbata . . . . V. 40.
<b>Oxyicerca.</b>	macer . . . . IV. 56.	bicolor . . . . V. 39.
centralis . . . . III. 14.	<b>Syrphidae.</b>	frandulosa . . . . V. 41.
unifasciata . . . . III. 15.	<b>Temnocera.</b>	<b>Pteralastes.</b>
<b>Metoponia.</b>	megacephala . . . . IV. 57.	lituratus . . . . IV. 81.
obscuriventris . . . . IV. 45.	<b>Lepidomyia.</b>	thoraciens . . . . IV. 80.
similis . . . . IV. 44.	calopus . . . . V. 38.	<b>Helophilus.</b>
<b>Leptidae.</b>	<b>Sericomyia.</b>	divisus . . . . IV. 78.
<b>Chrysopila.</b>	chalcopyga . . . . III. 20.	hamatus . . . . IV. 79.
foeda . . . . I. 18.	<b>Spilomyia.</b>	laetus . . . . IV. 77.
rotundipennis . . . . I. 19.	fusca . . . . V. 34.	latifrons . . . . IV. 73.
velutina . . . . I. 17.	hamifera . . . . V. 33.	integer . . . . IV. 76.
<b>Leptis.</b>	<b>Temnostoma.</b>	obscurus . . . . IV. 74.
costata . . . . II. 4.	aequalis . . . . V. 36.	obsoletus . . . . IV. 75.
dimidiata . . . . III. 17.	alternans . . . . V. 37.	<b>Chrysotoxum.</b>
hirta . . . . I. 21.	obscura . . . . V. 35.	laterale . . . . V. 42.
ochracea . . . . II. 3.	<b>Tropidia.</b>	pubescens . . . . V. 43.
terminalis . . . . I. 20.	mamillata . . . . I. 68.	ventricosum . . . . V. 44.
scapularis . . . . I. 22.	<b>Didea.</b>	<b>Microdon.</b>
<b>Asilidae.</b>	fuscipes . . . . IV. 82.	coarctatus . . . . V. 47.
<b>Leptogaster.</b>	<b>Spheginia.</b>	laetus . . . . V. 46.
badius . . . . II. 6.	infuscata . . . . III. 23.	tristis . . . . V. 45.
favillaceus . . . . II. 12.	lobata . . . . III. 21.	<b>Ceria.</b>
flavipes . . . . II. 15.	rufiventris . . . . III. 22.	abbreviata . . . . V. 48.
incisuralis . . . . II. 11.	<b>Baccha.</b>	<b>Hybotidae.</b>
murinus . . . . II. 9.	capitata . . . . III. 25.	<b>Brachystoma.</b>
obscuripes . . . . II. 13.	cognata . . . . III. 27.	binummus . . . . II. 16.
pictipes . . . . II. 7.	lugens . . . . III. 24.	nigrimana . . . . II. 17.
tenuipes . . . . II. 14.	obscuricornis . . . . III. 26.	serrulata . . . . I. 23.
testaceus . . . . II. 10.	<b>Doros.</b>	<b>Syneches.</b>
varipes . . . . II. 8.	aequalis . . . . IV. 84.	albonotatus . . . . II. 18.
<b>Bombylidæ.</b>	flavipes . . . . IV. 83.	pusillus . . . . I. 25.
<b>Bombylius.</b>	<b>Chrysochlamys.</b>	rufus . . . . I. 24.
atrieps . . . . IV. 49.	buccata . . . . IV. 72.	<b>Syndyas.</b>
haemorrhoicus . . . . IV. 46.	<b>Chilosia.</b>	dorsalis . . . . I. 26.
pulchellus . . . . IV. 47.	capillata . . . . IV. 65.	polita . . . . I. 27.
	comosa . . . . IV. 66.	<b>Empidae.</b>
	cyanescens . . . . IV. 67.	<b>Empis.</b>
	lencoparea . . . . IV. 69.	armipes . . . . I. 32.
	pallipes . . . . IV. 70.	

barbata . . . . .	II. 19.	pectinata . . . . .	I. 49.	Platypalpus.
labiata . . . . .	I. 33.	politula . . . . .	II. 29.	aequalis . . . . . V. 75.
laevigata . . . . .	V. 49.	priapulus . . . . .	I. 54.	apicalis . . . . . V. 79.
leptogastra . . . . .	III. 30.	pulchra . . . . .	I. 40.	debilis . . . . . III. 37.
longipes . . . . .	V. 51.	pulla . . . . .	I. 44.	discifer . . . . . III. 36.
nuda . . . . .	II. 20.	pusio . . . . .	I. 63.	flavirostris . . . . . V. 80.
obesa . . . . .	I. 28.	rava . . . . .	II. 25.	laetus . . . . . V. 81.
pallida . . . . .	I. 30.	rustica . . . . .	V. 56.	lateralis . . . . . V. 78.
picta . . . . .	III. 28.	sellata . . . . .	I. 42.	mesogrammus . . . . . III. 38.
poeciloptera . . . . .	I. 31.	soccata . . . . .	I. 67.	pachycnemus . . . . . V. 77.
poplitea . . . . .	III. 29.	sordida . . . . .	I. 58.	trivialis . . . . . V. 76.
rufescens . . . . .	V. 52.	testacea . . . . .	II. 24.	Phonentisca.
sordida . . . . .	I. 29.	umbilicata . . . . .	I. 65.	bimaculata . . . . . III. 35.
spectabilis . . . . .	II. 21.	umbrosa . . . . .	V. 53.	Tachypeza.
stenoptera . . . . .	V. 50.	ungulata . . . . .	I. 66.	clavigipes . . . . . V. 73.
varipes . . . . .	I. 34.	unimaculata . . . . .	II. 33.	pusilla . . . . . V. 74.
Pachymeria.		vara . . . . .	I. 57.	rapax . . . . . V. 71.
brevis . . . . .	II. 22.	vittata . . . . .	II. 23.	rostrata . . . . . V. 72.
pubica . . . . .	I. 35.	Hilara.		Synamphotera.
Rhamphomyia.		atra . . . . .	II. 42.	bicolor . . . . . III. 34.
angustipennis . . . . .	I. 55.	basalis . . . . .	II. 45.	Hemerodromia.
aperta . . . . .	II. 27.	brevipila . . . . .	II. 41.	defecta . . . . . II. 55.
basalis . . . . .	V. 54.	femorata . . . . .	II. 35.	notata . . . . . II. 53.
brevis . . . . .	I. 52.	gracilis . . . . .	II. 44.	obsolete . . . . . II. 52.
candicans . . . . .	V. 61.	leucoptera . . . . .	II. 43.	scapularis . . . . . II. 54.
clavigera . . . . .	I. 53.	lutea . . . . .	III. 33.	valida . . . . . II. 51.
conjuncta . . . . .	I. 56.	macroptera . . . . .	III. 32.	vittata . . . . . II. 56.
corvina . . . . .	I. 51.	mutabilis . . . . .	II. 40.	Clinocera.
crassinervis . . . . .	I. 59.	nigriventris . . . . .	II. 38.	lineata . . . . . II. 50.
debilis . . . . .	I. 45.	seriata . . . . .	V. 63.	simplex . . . . . II. 49.
dimidiata . . . . .	I. 36.	testacea . . . . .	V. 64.	Dolichopodidae.
exigua . . . . .	II. 32.	tristis . . . . .	V. 62.	Dolichopus.
frontalis . . . . .	II. 28.	trivittata . . . . .	II. 39.	albicipiliatus . . . . . II. 59.
fumosa . . . . .	I. 39.	umbrosa . . . . .	II. 34.	dorycerus . . . . . V. 85.
gilvipes . . . . .	I. 48.	unicolor . . . . .	II. 37.	fulvipes . . . . . II. 61.
glabra . . . . .	I. 41.	velutina . . . . .	II. 36.	melanocerus . . . . . V. 86.
gracilis . . . . .	I. 43.	Hormopeza.		palaestricus . . . . . V. 84.
hirtipes . . . . .	V. 59.	brevicornis . . . . .	V. 65.	praeustus . . . . . II. 62.
impedita . . . . .	II. 31.	nigricans . . . . .	V. 66.	quadrilamellatus . . . . . V. 83.
incompleta . . . . .	III. 31.	Gloma.		setosus . . . . . II. 63.
irregularis . . . . .	V. 60.	obscura . . . . .	V. 68.	socius . . . . . II. 60.
laevigata . . . . .	I. 37.	rufa . . . . .	V. 67.	splendidulus . . . . . V. 82.
leucoptera . . . . .	I. 62.	Cyrtoma.		Tachytrechus.
limbata . . . . .	I. 60.	femorata . . . . .	V. 69.	angustipennis . . . . . II. 64.
liturata . . . . .	I. 61.	halteralis . . . . .	II. 46.	Gymnopternus.
longicanda . . . . .	I. 38.	longipes . . . . .	II. 47.	coxalis . . . . . V. 87.
longicornis . . . . .	I. 47.	pilipes . . . . .	II. 48.	meniscus . . . . . V. 88.
longipennis . . . . .	I. 46.	procera . . . . .	V. 70.	Pelastoneurus.
luctifera . . . . .	I. 50.	Tachydromidae.		abbreviatus . . . . . V. 89.
lugens . . . . .	II. 30.	Stilpon.		alternans . . . . . V. 91.
lateiventris . . . . .	V. 57.	varipes . . . . .	II. 58.	lamellatus . . . . . V. 90.
macilenta . . . . .	V. 55.	Drapetis.		Porphyrops.
mutabilis . . . . .	II. 26.	pubescens . . . . .	II. 57.	longipes . . . . . V. 92.
nana . . . . .	I. 64.			
nigricans . . . . .	V. 58.			

<i>Chrysotus.</i>	latericia . . . II. 89.	<i>tenuispina . . . I. 80.</i>
cornutus . . . II. 65.	longipennis . . II. 90.	<i>umbrosa . . . III. 57.</i>
picticornis . . II. 66.	plumata . . . II. 88.	<i>Pachycerina.</i>
<i>Sympyenus.</i>	<i>Scoliocentra.</i>	<i>verticalis . . . I. 82.</i>
nodatus . . . II. 68.	fraterna . . . III. 51.	<i>Lauxania.</i>
<i>Hydrophorus.</i>	helvola . . . II. 80.	<i>albovittata . . II. 79.</i>
parvus . . . II. 67.	<i>Anorostoma.</i>	<i>femoralis . . . I. 89.</i>
<i>Psilopus.</i>	marginata . . . II. 81.	<i>gracilipes . . . I. 85.</i>
dimidiatus . . II. 70.	<i>Allophyla.</i>	<i>manuleata . . . I. 88.</i>
melampus . . . II. 69.	laevis . . . II. 85.	<i>muscaria . . . I. 87.</i>
tener . . . II. 71.	<i>Blepharoptera.</i>	<i>obseura . . . I. 86.</i>
<b>Tachinidae.</b>	armipes . . . II. 83.	<i>opaca . . . I. 84.</i>
<i>Wahlbergia.</i>	leucostoma . . III. 53.	<i>trivittata . . . I. 90.</i>
brevipennis . . IV. 91.	lutea . . . III. 52.	<i>variagata . . . I. 83.</i>
<i>Hyalomyia.</i>	pubescens . . II. 82.	
triangulifera . . IV. 85.	tristis . . . II. 84.	<b>Heteroneuridae.</b>
<i>Xysta.</i>		<i>Heteroneura.</i>
didyma . . . IV. 86.	<i>Sciomyzidae.</i>	<i>melanostoma . . V. 97.</i>
<i>Himantostoma.</i>	<i>Tetanocera.</i>	<i>latifrons . . . IV. 93.</i>
sugens . . . IV. 87.	ambigua . . . V. 95.	<i>spectabilis . . IV. 92.</i>
<i>Cistogaster.</i>	rotundicornis . . I. 70.	<i>Anthophilina.</i>
divisa . . . IV. 88.	triangularis . . I. 69.	<i>tenuis . . . IV. 95.</i>
<i>Trichopoda.</i>	<i>Sciomyza.</i>	<i>terminalis . . . IV. 94.</i>
radiata . . . IV. 89.	luctifera . . . I. 71.	<i>variegata . . . IV. 96.</i>
trifasciata . . . IV. 90.	<b>Trypetidae.</b>	<i>Ischnomyia.</i>
<b>Anthomyidae.</b>	<i>Trypetta.</i>	<i>vittata . . . IV. 97.</i>
<i>Lispe.</i>	abstera . . . II. 77.	<b>Opomyzidae.</b>
sociabilis . . . II. 72.	alba . . . I. 72.	<i>Opomyza.</i>
<b>Cordyluridae.</b>	albidipennis . . I. 73.	<i>Inrida . . . V. 98.</i>
<i>Cordylura.</i>	atra . . . II. 74.	<b>Ephydriidae.</b>
adusta . . . III. 41.	finalis . . . II. 78.	<i>Psilopa.</i>
angustifrons . . III. 45.	geminata . . . II. 75.	<i>nobilis . . . II. 92.</i>
bimaculata . . III. 40.	sarcinata . . . II. 73.	<i>Discocerina.</i>
cineta . . . III. 47.	timida . . . II. 76.	<i>leucoprocta . . I. 93.</i>
confusa . . . III. 43.	vernoniae . . I. 74.	<i>orbitalis . . I. 91.</i>
cornuta . . . III. 48.	<b>Lonchaeidae.</b>	<i>simplex . . I. 92.</i>
flavipes . . . III. 46.	<i>Palloptera.</i>	<i>Hydrellia.</i>
gilvipes . . . III. 49.	jucunda . . . III. 55.	<i>formosa . . . I. 94.</i>
nana . . . V. 94.	superba . . . I. 75.	<i>Philygria.</i>
pleuritica . . . III. 42.	terminalis . . III. 54.	<i>debilis . . . I. 96.</i>
praeusta . . . V. 93.	<b>Sapromyzidae.</b>	<i>opposita . . . I. 95.</i>
setosa . . . III. 44.	<i>Sapromyza.</i>	<i>Hyadina.</i>
terminalis . . . III. 39.	bispina . . . I. 79.	<i>gravida . . . IV. 98.</i>
<i>Hydromyza.</i>	cineta . . . I. 81.	<i>Parydra.</i>
confluens . . . III. 50.	compedita . . I. 76.	<i>abbreviata . . I. 97.</i>
<b>Helomyzidae.</b>	decora . . . V. 96.	<i>varia . . . IV. 100.</i>
<i>Helomyza.</i>	fraterna . . . I. 77.	<i>Ephydria.</i>
apicalis . . . II. 86.	quadrilineata . . I. 78.	<i>subopaca . . . V. 99.</i>
assimilis . . . II. 87.	rotundicornis . . III. 56.	<i>Scatella.</i>
	stictica . . . III. 58.	<i>obsoleta . . . I. 98.</i>
		<i>sejuncta . . . IV. 99.</i>

<i>Caenia.</i>	formosa . . . III. 61.	fossulata . . . III. 82.	
spinosa . . . V. 100.	longula . . . III. 64.	grata . . . III. 92.	
<b>Geomyzidae.</b>			
<i>Diastata.</i>	nigriceps . . . III. 63.	melanocera . . . III. 91.	
eluta . . . III. 59.	nigricornis . . . III. 65.	obsecuricornis . . . III. 90.	
pulchra . . . I. 100.		producta . . . III. 96.	
<i>Diplocentra.</i>		pubescens . . . III. 88.	
helva . . . II. 91.		quinquepunctata III. 94.	
<b>Drosophilidae.</b>			
<i>Amiota.</i>		Sahlbergi . . . III. 95.	
humeralis . . . II. 93.		sanguinolenta . . . III. 84.	
leucostoma . . . II. 94.		sulphurea . . . III. 83.	
<i>Drosophila.</i>		trivialis . . . III. 87.	
adusta . . . II. 98.		unicolor . . . III. 93.	
amoena . . . II. 96.		variceps . . . III. 86.	
ampelophila . . . II. 99.		versicolor . . . III. 97.	
dimidiata . . . II. 95.			
punctulata . . . II. 100.		<b>Agromyzidae.</b>	
terminalis . . . III. 60.		<i>Milichia.</i>	
tripunctata . . . II. 97.		picta . . . I. 99.	
<b>Oscinidae.</b>			
<i>Crassiseta.</i>		<i>Odontocera.</i>	
costata . . . III. 62.		dorsalis . . . III. 98.	
		<b>Phytomyzidae.</b>	
		<i>Phytomyza.</i>	
		Clematidis . . . III. 100.	
		Ilicis . . . III. 99.	